

静脉滴注双黄连注射液引起过敏反应 1 例

张赛男 郑国民 (江苏省淮阴市第二人民医院, 淮阴 223002)

1 过敏经过

患者朱某, 男, 27 a, 因头痛、发热咳嗽 2 天于 1996 年 6 月 12 日来院就诊。经检查, $T 38.5^{\circ}\text{C}$, 咽部充血, 扁桃体 I° 肿大, 心肺正常, 腹部平软, 神经系检查正常, 诊断为上呼吸道感染。给予 10% 葡萄糖注射液 500 ml (本院制剂室提供, 批号 960419, 以下皆同), 加青霉素 800 万 iu 及双黄连注射液 60 ml (哈尔滨第三制药厂生产, 规格 20 ml, 批号 9602092) 静脉滴注。中午 12:30 开始输注, 约 10 min 后, 患者即感到上唇发麻, 右半唇隆起约 1 cm 高, 肿块呈白色, 质地硬, 有胀痛感觉, 同时面部及全身潮红、发烫、寒颤, 感到胸闷、气促、心悸。立即停止输液, 给予肌注非那更 25 mg。考虑到患者以往无青霉素过敏史, 本次青霉素皮试阴性, 双黄连是第一次使用等情况后, 试停用双黄连, 给予 10% 葡萄糖注射液 500 ml 加青霉素 800 万 iu

及地塞米松磷酸钠注射液 10 mg 静脉滴注, 并嘱患者用药前复做青霉素皮试, 患者皮试后仍阴性。同日下午 3:00 开始输注, 先前的不适症状逐渐消失, 静滴结束时, 患者右半唇的肿块亦已消除。以后每天给予 10% 葡萄糖注射液加青霉素 800 万 iu 静脉滴注, 连续三天, 同时加服急支糖浆, 患者无任何不良反应, 于 1996 年 6 月 16 日上呼吸道感染完全痊愈。

2 讨论

2.1 本例中患者以往无青霉素过敏史, 双黄连系第一次使用, 考虑过敏反应可能由双黄连引起, 故停用双黄连, 其他药物照常使用, 输液产地、批号均相同, 用药后患者无任何不良反应, 这些事实说明过敏反应非青霉素引起, 非输液反应引起, 确系由于使用双黄连注射液所致。