

复方甲基异噁唑致严重龟头溃烂1例

赵桂法 王承菊 (山东省临朐县中医院, 临朐 262600)

患者, 男, 29 a。因患咽炎, 应用复方甲基异噁唑片(山东新华制药厂), 2片/次, Bid, 口服, 首次加倍; 复方草珊瑚含片(江西江中制药厂), 含化, 1片/次, q4 h。用药6 h后, 出现头痛, 头晕, 全身不适, 龟头发痒, 随即龟头出现水肿, 12 h后水肿破裂, 龟头出现溃烂, 痛痒难忍。停用上述两药, 给予抗过敏药治疗。口服地塞米松0.75 mg, Tid; 维生素C 0.3, Tid; 葡萄糖酸钙1.0, Tid, 局部用高锰酸钾溶液(1:5000)洗, Bid, 洗后涂红霉素眼膏并用无菌纱布包扎。3 d后痛痒症状消失, 局部溃烂明显好转。停用抗过敏药, 继续局部用药。

8 d后龟头皮肤脱痂痊愈。因咽部仍感不适, 同时为证实上述症状为何药所致, 故在严密观察下再服复方草珊瑚含片, 服药3 d, 未发现任何不适, 故确诊上述症状为复方甲基异噁唑所致。

复方甲基异噁唑为临床常用的毒付作用较小的磺胺类药物, 主要用于呼吸道感染和泌尿系感染, 其主要不良反应为泌尿系损害, 少数人出现皮疹, 药热等过敏反应, 且多发生在用药后7~10 d⁽¹⁾, 而本例患者体格强壮, 无药物过敏史, 却于用药后1 d即出现严重的龟头溃烂实属罕见。

收稿日期: 1997-03-14