

西比灵致眼睛复视1例

李 滕 王 梅 (滕州市中心医院, 滕州 277500)

西比灵(盐酸氟桂利嗪)为选择性钙拮抗剂,近年来在临床上使用较广泛,主要用于典型或非典型偏头痛的预防性治疗,由前庭功能紊乱引起的眩晕的对症治疗。笔者发现服用西比灵致眼睛复视1例,报告如下。

患者,女性,42 a,因患椎一基底动脉系统病变,导致脑的供血不足而引起短暂性脑缺血,常常眩晕,按医嘱服用西比灵,每次10 mg,每日1次。服用2 d,患者自行停药2 d,第5天又服用10 mg,第6日上午即出现眼睛复视现象。患者自认为是眼睛有毛病,故就诊于眼科,经查眼底一切正常。于是,患者怀疑药物所致,故停用西比灵,没做任何治疗,

复视现象逐渐减轻,持续一周后消失。随访半年,无复发。

讨论 西比灵是西安杨森制药有限公司生产的胶囊剂,常见的不良反应有嗜睡、疲惫、乏力,性情冷淡和抑郁,可致锥体外系反应。少见的不良反应有胃肠道反应,中枢神经系统反应,复视现象未见报道。就患者本身疾病而言,可能因短暂性脑缺血,而出现复视现象,可是患者得病五年多来,从未发生过复视,且停药后半年也未出现复视,故笔者认为认为是药物所致。

收稿日期:1997-05-06