

口服茶苯海明致过敏性休克 1 例

田仁慧 (湖南省凤凰县人民医院, 凤凰 416200)

抗组胺药茶苯海明(乘晕宁)是 H_1 受体拮抗剂,有较强的抗晕动作用,广泛用于防治乘车船引起的恶心呕吐。现报道口服茶苯海明致过敏性休克 1 例:

患者女,38a。有晕车史,外出乘车前约 30min 口服茶苯海明 50mg,约 15min 后突感全身不适,烦躁,皮肤搔痒,恶心呕吐,大量出汗,面色苍白。入院查体: $T36.3^{\circ}\text{C}$, P 极细弱, $BP4/0\text{kPa}$, $R28$ 次/min,头部冷汗,四肢湿冷,面色苍白,全身皮肤潮红,有小红丘疹,诊断为茶苯海明所致过敏性休克。立即给予输氧,肌注肾上腺素 0.5mg,静注地塞米松 15mg,10%

葡萄糖酸钙 10ml,20min 后症状好转,继续静滴 10%葡萄糖注射液 1000ml,加肌苷 0.3g,ATP40mg,VitC1g,3h 后血压恢复正常,上述症状消失。继续观察 6h 后返家。

茶苯海明系苯海拉明与 8-氯茶碱的复盐,常见的不良反应有滞呆,思睡,疲乏,头晕,恶心呕吐等,偶有幻觉,夜间视力下降,锥体外系征及皮疹。引起过敏性休克的报道国内少见。此药在车站码头等场所的商店有售,应引起注意。

收稿日期:1997—04—30