

局部注射 2% 普鲁卡因注射液出现过敏 1 例

肖克来提 阿子古丽 (新疆伊犁州友谊医院, 伊犁 835000)

普鲁卡因为常用酯类局麻药, 对皮肤粘膜穿透力弱, 一般要注射给药, 作用于神经组织才能生效。0.25~0.5% 溶液仅能作用于纤细感觉神经末梢; 2.0% 溶液才能阻滞粗大的运动神经纤维的传导, 主要用于门诊手术, 进行浸润局麻或区域阻滞。本文报道拔牙时用 2.0% 普鲁卡因过敏 1 例:

患者, 女, 21a, 拔牙前给 2.0% 普鲁卡因作过敏试验阴性后局部注射 2.0% 普鲁卡因注射剂 2ml, 约 2min 后患者出现呼吸困难, 心慌, 烦躁不安, 面色苍

白。

体检: 血压 140/100mmHg, 两侧瞳孔等在等圆, 对光反射存在, 双肺呼吸音清, 心率 100 次, 心律齐, 无杂音, 腹部软, 无压痛, 肝脾(-)。处理: 吸氧, 10% G · S500ml 加地塞米地松注射液 20mg 静点, 扑尔敏 10mg 肌注及 10% G · S500ml、维生素 C3.0g 静点, 0.9% NaCl500ml、vitB6200mg, 静点, 非那根 25mg 肌注, 治疗后痊愈出院。

收稿日期: 1997—08—03