

# 新斯的明致休克 1 例

谭开云 (浙江省舟山市医院, 舟山 316004)

患者女性 58 岁, 农民。因尿潴留求治, 经尿常规, 血常规及心电图示检查均正常。给甲基硫酸新斯的明针 1mg 肌肉注射(批号: 沪卫药准字(1981 第 0773 号), 约 5min 后患者突然感腹部疼痛, 大汗淋漓, 面色苍白, 四肢颤抖, 跌倒于地失去知觉。当即测血压 0, 即给肌肉注射阿托品计 0.5mg 后测血压 0/4KPa, 恢复知觉。又给 50% 葡萄糖液 40ml 内加山莨菪碱针 10mg, 静脉注射后测血压 12/7Kpa, 腹痛减轻, 大汗消失, 四肢颤抖减轻, 面色好转。又改 5% 葡

萄糖液 500ml 内加山莨菪碱 30mg, 静脉滴注, 10min 后以上症状消失, 血压恢复正常。

讨论: 新斯的明常用于治疗重症肌无力, 手术后腹胀与尿潴留等, 副作用较少, 在治疗作用方面选择性较高。但该患者用常用量注射 5min 后出现休克, 可能与年龄大, 胆碱能神经末梢释放乙酰胆碱浓度增加, 产生拟胆碱作用增强影响心血管功能有关, 致患者出现休克。

收稿日期: 1997-02-04