

正红花油外搽过敏反应 1 例

孙逸佃 徐爱荣¹(黄石 435001 湖北黄石市一医院药剂科;¹黄石 435001 湖北黄石市医药公司)

患者男,60a。1997 年 3 月 19 日,因面部右侧撞伤,自用正红花油局部外搽。次日右侧上、下眼睑、面部出现红斑、瘙痒。又用热毛巾外敷,随即发生肿胀,右眼视物困难。于 3 月 21 日入院治疗。皮肤科情况:右侧上、下眼睑、面部有大片不规则的鲜红斑,肿胀明显,皮损面无水疱、破溃。眼结膜正常。患者体温正常,精神、体力、食欲、睡眠尚可。诊断为正红花油过敏反应。即以 10% 葡萄糖 500ml,VC3.0,10% 葡萄糖酸钙 10ml 静滴,qd,口服特非拉丁片 60mg,bid,扑尔敏片

4mg,qN,VC 片 0.2,tid,生理盐水 500ml 加庆大霉素针 24 万 u 湿敷。3 月 25 日,见患者右侧眼睑、面部仍有不规则淡红斑。肿胀、瘙痒较入院时明显好转。3 月 28 日,患者右侧眼睑、面部红斑,水肿完全消退出院。

正红花油内含白油、人造桂油、白樟油、桂叶油、松节油、桂醛、冬青油、血竭……等药物,为外科止血止痛、消炎去肿之良药。鲜见过敏反应之报道。

收稿日期:1997-09-01