

法莫替丁致关节炎 1 例

许敬菊(滕州 277500 山东滕州人民医院)

患者男,12 岁。阵发性中上腹胀痛、呕吐 7d,伴呕吐咖啡物数次,以腹痛待诊收住院。既往无呕吐,泛酸及血便史。体查除全腹轻压痛,中上腹稍明显外,未见其它异常。血及尿常规,大便隐血,淀粉酶等正常。晨空腹 B 超查见胃内有较多液体潴留,拟诊十二指肠溃疡和胃窦炎。予法莫替丁口服,每次 5mg,每日 2 次,作诊断性治疗。服药第 2 天腹痛好转,但出现足跟部和膝、踝、肘、肩及指间关节痛,并见指间关节红肿及活动受限,未见皮肤环形红斑,皮下小结,发热,心脏炎及肝脾肿大等异常。血及尿常规,类风湿因子,抗链球菌溶血素“O”,C 反应蛋白,血沉等均在正常范围。停服法

莫替丁后第 3 天关节痛自行减轻指间关节炎亦日渐消退,停药后第 5 天自然痊愈。

讨论:法莫替丁是继西米替丁、呋喃硝胺后一种新的 H_2 受体拮抗剂。以噻唑取代咪唑环及呋喃环,无西米替丁所特有的抗雄激素作用,对餐后饱胀及烧心的缓解优于雷尼替丁。随临床广泛应用,其副作用在成人病例多,因儿科应用较少,有关报道也较少。法莫替丁致关节炎和关节痛是此药少见的副作用之一,在国内儿科尚未见有文献报道,其发病机理不明,有待进一步观察和研究。

收稿日期:1997-12-24