

头孢拉啶致过敏性休克 1 例

曹永安 杨 俭(南京 210009 江苏职工医科大学)

患者女,18 岁。因恶心、呕吐、上腹部隐痛、扁桃腺疼痛伴发热入院就诊。诊断为急性胃炎伴上呼吸道感染。给予静脉滴注头孢拉啶(中美上海施贵宝制药有限公司)、维生素 B₆ 等药物治疗。给药数滴后,患者即出现头晕、眼花、胸闷、四肢发麻、面色苍白等症状。体检示:神志尚清,BP7/4kPa,HR100 次/min。诊断:过敏性休克。采取立即停用头孢拉啶,同时给予肾上腺素、地塞米松加入氯化钠静脉推注,吸氧等措施,休克症状逐缓解。2h 后患者神清,BP13/9kPa,HR78 次/min,头晕、胸闷等症状消失。患者曾多次因感染口服过头孢

拉啶。

讨论:患者有口服头孢拉啶史,未见任何不适,而静脉滴注引起过敏性休克,可能与制剂中的杂质有关。临床上头孢类抗生素的应用较为广泛,通常不如用青霉素那样谨慎。临床上已见头孢类引起剥脱性皮炎、皮疹等过敏反应病例。头孢拉啶引起过敏性休克尚未见报道。建议临床医生使用头孢类抗生素时,严格按照药典要求进行皮试。

收稿日期:1998-06-29