

白附子与关白附的区别和运用

朱亚丽(长兴 313100 浙江长兴县中医院)

在临床运用处方应付中,常出现白附子与关白附相混淆的现象。笔者试就二药的区别加以分析,以期引起大家的注意,在临床得以正确运用。

白附子与关白附本为二种完全不同的中草药,二者不可相互混同和代替。

白附子与关白附的鉴别:白附子来源天南星科独角莲块茎;产地:河南、甘肃、湖北等;主要成份: β -各甾醇及其D-葡萄糖甙等;性味:性大温,味辛、甘,有毒;性状:呈椭圆形,长2~5cm,表面白色,有环纹及根痕、顶端具茎痕及芽痕、难折断,断面类白色,富粉性;功效:祛风痰,镇痉。关白附来源毛茛科黄头乌头块根;产地:东北三省;主要成分:乌头次碱,关附甲、乙、丙、丁、戊系等;性味:辛、甘、大热、有毒;性状:母根呈圆锥形,子根卵形或长圆形,表面棕褐色,有明显的皱纹及横向突起的根痕,断面类白色,母根有蜂窝状空隙,子根充实显粉性,可见成环的筋脉点(维管束群);功效:祛寒湿,止痛)。

《中药鉴定学》一书中关于白附子[附注]:指出:白附子之名始见于《名医别录》,苏恭谓“本出高丽,今出凉州以西……根形似天雄”。时珍谓“根正如草乌头之小者,长寸许,干者皱纹有节”。以上本草记述,是指产于东北三省的“关白附。”

《中药学》一书中关于白附子[附注]指出:《别录》

已收白附子,认为“主心痛血痹,而上百病,行药势”。但历代本草所用的白附子均今之关白附,毒性很大,不应与禹白附混淆。

综上所述,关白附在古代本草中虽名为“白附子”,与当今临床运用的白附子是有严格区分的,古今虽将二者同称,却为同名异物,而现在就应言明关白附或白附子,切不可再模棱两可。

但是,实际运用中尚不尽人意,如《中药炮制学》等书在叙述白附子时未阐明两者的区别,再加上历代本草引用名的影响和各地的用药习惯,造成了两者之间的混淆。其实两者功效不尽相同,毒性也有大小,关白附毒性很大,若中药调剂人员误将关白附作白附子给了病人,不但不能起到预期的疗效,相反可能引起中毒反应。反之,若将白附子作关白附付出,也会收不到预期的疗效。再者,白附子有祛风痰作用,可与半夏相伍,但乌头反贝母、瓜蒌、白薇、白芨、半夏,按化学成分讲(关白附也含有剧毒的双酯类生物碱——次乌头碱等成份)关白附和上述诸药有相反作用,因此在含这些药物的处方中,若将关白附作白附子付出,则配伍上可能会出现相反作用。

为此,笔者建议:在本草书籍中,编校者应注出其中的“白附子”为当今的关白附,避免使用关白附的古名“白附子”。在处方中,医师也应该不用它,沿用本草

中国现代应用药学杂志 1998 年 8 月第 15 卷增刊

处方时,方中的“白附子”应改为“关白附”。为了避免不必要的混乱,便于医疗界的相互交流,各省市对此二药的来源与处方应付,应以《中国药典》为标准,将二药的来源及处方应付统一为:关白附:[来源]为毛茛科黄

花乌头的块根。[处方应付]写关白附付关白附,写生付生。白附子:[来源]为天南星科独角莲的干燥块茎。[处方应付]写白附子付禹白附(牛奶白附、制白附、红南星等),写生付生。

收稿日期:1998-04-22