

伊曲康唑的不良反应

王春霞(广州 510515 第一军医大学南方医院药学部)

伊曲康唑(又名斯皮仁诺)为三氮唑衍生物,是一种合成的广谱抗真菌药。临床应用常见胃肠道不适,其它不良反应亦屡见报道,现总结如下。

1 胃粘膜出血

潘晓峰^[1]等报道 1 例女性患者,因灰指甲予以伊曲康唑 100mg,po,bid,第 4 天,出现胃部不适感,服药一个疗程。停药 30d 后,继服第二疗程,用法为 200mg,po,qd,服至 1 周时,重现前述症状,患者自行停药,第 3 天来院复诊。胃镜检查:球后及球部粘膜充血,散在出血斑点。胃窦部充血,水肿,全胃中度充血,见散在壁内出血点,经对症治疗痊愈。

2 白细胞减少

廖小敏^[2]报道 1 例皮炎患者因痰中检出白念珠菌,给伊曲康唑 400mg/d,po,bid,1 周后白细胞由 $9.8 \times 10^9/L$ 降至 $1.3 \times 10^9/L$,停药,给予升白安 3 片/d,po,tid,5d 后白细胞升至 $5.1 \times 10^9/L$ 。

3 多发性神经病并皮疹

王继跃^[3]等报道 1 例男 23 岁念珠菌龟头包皮炎患者,服用伊曲康唑 0.2g,qn。次日出现对称性双手腕关节以及双足趾麻木,轻微灼痛,第 3 天出现双大腿内侧及双侧小腿弥漫性红色斑片,停药 5d 皮肤红斑消退,但四肢感觉异常无缓解。予 VB₁₂针剂 250 μ g,肌注,qd 并口服 VB₁片 20mg,tid,肌苷片 0.2g,tid,5d 后症状明显缓解。

4 药疹

何斌^[4]等报道 1 女患者,因霉菌性阴道炎服用伊曲康唑 400mg,服药 3d 后左手臂起丘疹,微痒,第 4 天痒感加剧,躯干四肢出现弥漫性对称性斑丘疹,充血性红斑,皮损融合略高出皮面,压之褪色,肿胀明显,局部皮温高。诊断猩红热麻疹样型药疹。停药,以抗过敏对症治疗痊愈。李春阳^[5]等报道 1 例趾甲癣患者,给予伊曲康唑间歇冲击疗法治疗,服用 2 个疗程后,引起酒渣鼻样药疹。停药,局部给予皮质激素霜外搽,3 个月恢复正常。

5 急性泛发性发疹性脓疱病

李静波^[6]摘录 1 例男性患者,因甲真菌病口服酮康唑 6 个月,疗效不佳,改用伊曲康唑,7d 后患者发热达 104 $^{\circ}$ F,伴畏寒,恶心及呕吐,皮疹迅速发展。患者曾有乙肝病史。体检发现:躯干及肢体近端有泛发性表面发白的灼伤样红斑,胸背有较多的 1mm 浅表性脓疱,手和足有靶样皮损。皮肤活检证实为皮下脓疱和表浅血管单核细胞浸润,诊断 AGEP。口服泼尼松龙 60mg/d,症状在 48h 内明显消退,5d 后出院。

参考文献

- 1 潘晓峰,孙华兰,金成森.口服伊曲康唑胶囊引起胃粘膜出血 1 例.现代应用药学,1995,12(2):61.
- 2 廖小敏.伊曲康唑致白细胞减少症一例.中华皮肤科杂志,

1995,28(4):230.

- 3 王继跃,陈平.伊曲康唑致多发性神经病并皮疹 1 例.药物流行病学杂志,1995,4(3):180.
- 4 何斌,向肾华.伊曲康唑致药疹 1 例.临床皮肤科杂志,1996,(5):304.

- 5 李春阳,苑全德.伊曲康唑引起酒渣鼻样药疹一例.中华皮肤科杂志,1996,29(4):294.
- 6 李静波摘.伊曲康唑诱发急性泛发性发疹性脓疱病.国外医学·皮肤性病学分册,1996,22(5):309.

收稿日期:1998-05-27