

口服雷尼替丁胶囊引起全身关节酸痛乏力 1 例

吴其新 蒋文华 蔡长坤(上海 200072 上海铁路中心医院)

患者男,42 岁。有胃溃疡史,因大口噁酸,并吐出大量胃酸来院就诊,给与肌注 654-2 针 10mg,静滴 5% 葡萄糖 500ml,加雷尼替丁 50mg,3d 后症状缓解,改用口服雷尼替丁胶囊,150mg,早晚各一次,服 2 周后,感全身关节酸痛,乏力,举步困难。最严重时连钢笔都难以握住,人明显消瘦。门诊继续就诊,经内科门诊体格检查及血糖、CT 等检查,心、肺、肝、脾、肾、胰均正常。故考虑可能与服用雷尼替丁有关,遂停药,结果,症状缓解并逐渐消失。数日后,病人觉胃部不适,按前医嘱

自服雷尼替丁胶囊,3d 后又重复出现前述症状,再次来门诊治疗,经治医生改用他药,胃肠及全身酸痛等症状均消失。以上过程,雷尼替丁的副作用可初步确立。

雷尼替丁用于胃及十二指肠溃疡疗效高,具有速效和长效的特点,其副作用小而安全。常见的不良反应有头晕,恶心,出汗及胃刺激性,静注部位瘙痒,发红,有时可产生焦虑,兴奋,健忘,口服致全身关节酸痛乏力未见报导,应引起临床工作者注意。

收稿日期:1998-08-22