

环丙沙星致过敏 10 例报道

彭秀芳 阎学英 陈文霞(安阳 455004 河南安阳钢铁集团公司职工医院)

环丙沙星(CPFX)是 80 年代末期在国内上市的第 3 代氟喹诺酮类药物, 它具有广谱抗菌活性和良好的药代动力学性质。在喹诺酮类药物中临床评价最高, 具有广泛的应用价值, 但随着使用的日趋普遍, 一些不良反应也逐渐显露出来, 尤其是过敏反应, 现就文献报道综述如下。

1 张德星^[1]等报道, 应用环丙沙星引起紫癜 3 例。3 例患者均系呼吸系统感染, 使用环丙沙星(印度 Rambaxy, 批号: 02791, 进口许可证号: 890320)治疗, 在用环丙沙星 6~23d 后出现散在性紫癜, 以四肢为主。1 例出现在躯干部, 停药 7~14d 紫癜完全消失。

2 罗银花^[2]报道, 有 4 例患者, 静滴环丙沙星, 出现迟缓型血清样反应。用药后 3~5d 出现周身皮疹, 为红色粟样丘疹, 伴皮肤瘙痒, 停药后, 皮疹逐渐消失。

3 金亚丽^[3]报道, 有 1 例患者应用环丙沙星 2d 后出现头晕, 恶心及皮肤瘙痒, 周身遍布大块鲜红丘疹, 四肢以米粒大小红疹为主, 就诊后立即停药, 并用 5% 葡萄糖 500ml 加入地塞米松 5mg 静滴, 感觉减轻, 晚上又奇痒难忍, 用地塞米松 5mg 注射观察, 患者症状逐渐消失。

4 谢自斌^[4]等报道, 1 例患者第 1 天服用环丙沙星后, 自觉面部有少许粟粒样丘疹, 第 2 天服用后, 自感全身

皮肤瘙痒, 面部潮红, 躯干、四肢出现多形红斑, 全身乏力、心悸、失眠。停药治疗, 给予 50% 葡萄糖注射 40ml 加入 10% 葡萄糖酸钙注射液 10ml 静推, 口服息斯敏 10mg, qd, 6h 后症状逐渐好转, 3d 后完全消失。

5 沈阿虎^[5]报道, 环丙沙星引起肢端大疱表皮坏死松懈型药疹 1 例。患者因左手出现丘疹, 诊断为湿疹伴感染, 口服环丙沙星(浙江新昌制药股份有限公司, 批号: 9603283)2 粒, 服药后约 30min, 手部开始肿胀, 皮肤出现大疱, 接着皮肤变黑, 坏死, 即用大量激素、抗菌素治疗, 半个月后恢复出院。

由上可见, 环丙沙星虽具有广谱、高效、低毒等特点, 但在使用时仍应注意其不良反应, 对此广大医药工作者要引起高度重视, 确保患者的安全用药。

参考文献

- 1 张德星, 等. 药与临床, 1993, 12(2): 123.
- 2 罗银花. 乳酸环丙沙星注射液的不良反应. 中国医院药学杂志, 1995, 15(12): 538.
- 3 金亚丽. 环丙沙星致皮肤过敏反应 1 例. 中国药房, 1996, 7 (增刊 10): 380.
- 4 谢自斌, 王中和. 盐酸环丙沙星引起药疹 1 例. 中国药房, 1997, 7 (增刊 10): 384.
- 5 沈阿虎. 环丙沙星引起肢端大疱表皮坏死松懈型药疹 1 例报告. 中国现代应用药学, 1997, 14(6): 53.

收稿日期: 1998-05-25