

· 不良反应 ·

波依定引起牙龈增生与溢脓 1 例

傅其涛(杭州 310006 浙江省中医院)

患者女,68岁。因患高血压于1997年10月服波依定(阿斯特拉无锡制药有限公司,批号欠详)5mg,qd,口服,用药后血压逐渐恢复正常,但在用药后6个月逐渐出现牙龈增生,同时出现牙龈溢脓,停止服药,停药后虽未经药物治疗,1月后增生牙龈完全消退。停药2个月后因血压升高又服用波依定,剂量及用法同前,服药后4个月又出现牙龈增生,因咀嚼困难而停药,停药1月后增生的牙龈消退。1998年12月份因血压升高服波依定(阿斯特拉无锡制药有限公司,批号:9811006)5mg,qd,口服,服药2个月后出现牙龈增生,再次出现溢脓,停药后溢脓渐见消失,1月后牙龈增生消退。

讨论:波依定正式品名为非洛地平缓释片,该药是一种血管选择性钙离子拮抗剂,用于治疗高血压,降压效果较好。本例患者先后服用波依定3次,每次均出现牙龈增生,2次发生牙龈溢脓,停药后未经治疗自然消失,故认为此病人的牙龈增生,为口服波依定所致。溢脓为继发感染所引起。对其发病机制尚不清楚。从本例发病特点来看,不良反应发生时间与用药次数有关,当反复用药时,不良反应发病时间提早。但是,同期治疗的其他病人服用同一批号、同一剂量并未出现此种不良反应。故考虑与个体差异有关。

收稿日期:1998-03-18