

利维爱引起白细胞下降 1 例

杨玉芳 吴 闯(南宁 530027 广西医科大学第一附属医院药剂科)

患者女,59 岁。自 1997 年 3 月份以来,反复肢体乏力、多汗、失眠多梦等,时伴轰热感、面部潮红。曾在本院就诊,拟诊为“更年期综合征”,予倍美力片(0.625 mg/d)、安宫黄体酮片(2 mg/d)治疗后,以上症状有所好转。1998 年 5 月 25 日开始改用利维爱片治疗,每天半片(1.25 mg);同时服用钙尔奇 D。7 月 29 日复查血常规,白细胞由用药前的正常下降到 $3.6 \times 10^9/L$,予加用肌苷片、鲨肝醇片。8 月 8 日复查血白细胞为 $3.3 \times 10^9/L$,考虑白细胞降低是药物所致,停用所有药物。8 月 10 日血白细胞为 $3.9 \times 10^9/L$;8 月 14 日血白细胞上升到 $4.5 \times 10^9/L$ 。再次服用利维爱,每天一片(2.5

mg);同时服用氨肽素片、葡萄糖酸钙片和维生素 A + D。8 月 19 日血白细胞再次降到 $3.6 \times 10^9/L$,予停用利维爱,其余的药继续服用。9 月 3 日查血白细胞为 $5.8 \times 10^9/L$;10 月 3 日血白细胞为 $5.0 \times 10^9/L$ 。由此看来,该例患者血白细胞下降是由利维爱所致无疑。

利维爱有效成分是 7-甲异炔诺酮,临床上用于治疗自然绝经和手术绝经所引起的各种症状。该药在我国的应用时间较短,不良反应的报道极少,目前尚未发现有此类报道,其发生机理也尚未明确。

收稿日期:1998-11-11