

氨基糖苷类药物致过敏 1 例

蔡纪青(丽水 323000 浙江丽水市中医院)

患者女,28 岁。1998 年 9 月 1 日,因经常腰酸,下腹胀痛,白带多来我院就诊,医生诊断为慢性盆腔炎,用 10 % GS 500 ml 洁霉素 1.8 万 u + 丁胺卡那 0.4g + 0.5 % 灭滴灵 100 ml 进行点滴,点滴完毕回家后,感觉不舒服,脸面发烧感,手指伸屈不灵活,并有瘙痒症,第 2 天症状消失。根据医生建议此患者改用庆大霉素 + 红藤汤进行灌肠。第 3 天患者诉说比第 1 天更严重,手指关节肿胀,四肢端出现一大片的红色丘斑,非常痒,嘴唇四周发麻,说话不清,并有呼吸急促症,诊断为过敏性反应,后改用 10 % GS 500 ml + 洁霉素 1.8g + 0.

5 % 灭滴灵 100 ml 点滴,红藤汤灌肠,患者就没有发生症状。

讨论:该患者在静滴丁胺卡那时发生过敏反应,灌肠中用庆大霉素时也发生过敏反应,并后次比前次更严重,但停药后都自行消失,丁胺卡那与庆大霉素都属于氨基糖苷类药物,该类药物的过敏反应很少见。我们告诫该患者此类药物应禁用。因此,建议临床医生在诊断时,应详细询问患者的过敏史。特别是在使用过程中,如有皮疹、瘙痒症时,应停止使用。

收稿日期:1999 - 03 - 26