

服用曲尼司特致眩晕呕吐畏寒腹痛 1 例

来心舟(杭州 310053 杭州市浦沿镇中心卫生院)

曲尼司特为中国药科大学制药公司出品的新型抗变态反应药。由于其口服吸收快,毒副作用小,疗效确切而得到广泛应用。在临床上笔者遇到 1 例表现为眩晕呕吐、畏寒腹痛的复杂不良反应,特报道如下。

患者女,56 岁。因“变态反应性鼻炎”于 1999 年 1 月 28 日在浙医二院门诊,予以曲尼司特口服。在首次服用后即有恶心眩晕感,即自行停药。于 2 月 9 日因鼻炎症状明显,再次服用曲尼司特 2 粒(0.2g),服后约一小时,即出现眩晕呕吐、畏寒腹痛症状。呈水平位置性眩晕,移动头部即加重,恶心呕吐 4 次,吐出胃内容物,呈非喷射状。同时畏寒发抖,中上腹呈针刺样疼痛,自觉肠鸣频作,腹部鼓胀。无头痛腹痛腹泻。入院体检:BP 14/10kPa,HR 60 次/min,R 20 次/min,T 36.4℃,面苍白,急性病容。双侧瞳孔等圆大,约 2.5×2.5mm 对光反射灵敏,眼球无震颤。中耳无殊,伸舌居中,颈

软无抵抗。心肺无殊。腹平软,中上腹轻压痛,无反跳痛。肝脾肋下未及,肾区无叩痛,肠鸣 6 次/min。四肢肌张力略高,肌力正常。巴氏征(-),各深浅反射正常。辅助检查:Hb 13.4g/L;RbC $4.028 \times 10^{12}/L$;WBC $7.02 \times 10^9/L$;N:74%,L:26%;PLT: $144 \times 10^9/L$;EKG:窦性心律,大致正常心电图;B 超示肝内小血管瘤。血糖:5.6mmol/L。

根据目前病情立即予以地塞米松 5mg 静注,10%葡萄糖液加 654-II,维生素 C 及 B 静滴,静注后 5min 畏寒发抖好转,静滴后半小时诸症消失。

本例患者二次用药均有眩晕恶心,并排除了迷路炎,莫尼尔氏症等所致疾病后,诊断明确。提示临床医生应在使用曲尼司特后,注意观察其不良反应。

收稿日期:1999-03-18