

解磷注射液致过敏性休克 1 例

刘 云 兰仁奎 袁双红(云和 323600 浙江云和县人民医院)

解磷注射液是由抗胆碱能药苯那辛和胆碱酯酶复活剂氯磷定组成。临床上对急性有机磷农药中毒疗效甚佳。但由解磷注射液引起过敏性休克极少,现有 1 例报道如下。

患者男,50 岁。下午肩背农药“甲胺磷”给稻田治虫 1 h 左右,因药液有少量外漏,弄湿衣服,回家后感觉头昏,面部麻木,即自行来院就诊。肌注解磷注射液 2 ml(1 支)(北京四环制药厂,批号:980213)。10 min 后,病人即出现站立不稳、眩晕,呼吸急促,继而出现面色苍白,四肢湿冷,神志不清。测 BP 10/6 kPa, P115 次/min, R32 次/min 诊断为过敏性休克。

抢救:即给予吸氧,使其平卧、肌注肾上腺素注射

液 1 mg,静注地塞米松 10 mg 加生理盐水 20 ml,静注 10 % 葡萄糖酸钙 10 ml 加 50 % GS 20 ml。经过对症治疗 30 min 后症状逐渐好转脱险。测 BP 18/10 kPa, P90 次/min, R20 次/min。此后患者静滴 10 % GS 500 ml 加碘解磷定 1.0 g 和 5 % GNS 500 ml 加 VC 3.0 g、VB₆ 200 mg,静滴后恢复正常自行回家。

讨论:①患者否认有家族性疾病及传染性疾病,否认有食物和药物过敏史。因此认为是解磷注射液所致。②解磷注射液在临床上对抢救急性有机磷农药中毒有较好的疗效,但引起过敏性休克实属罕见,应引起注意。

收稿日期:1999 - 04 - 01