

刺五加注射液引起剧烈头痛 1 例

徐文科 姜宝满(芜湖 241001 安徽省皖南医学院弋矶山医院)

患者男,31 岁。因头晕,眼胀,全身乏力 2d 来院就诊。神经内科诊后,医嘱给予刺五加注射液 250 ml 静脉滴注,每日一次。

患者在输液厅接受静脉滴注刺五加注射液(黑龙江完达山制药厂,批号:990407)约 2 min 后,左侧手臂感到疼痛,并向左侧躯干部延伸,5 min 后左眼胀痛,左侧头痛剧烈,无法忍受。遂喊护士,发现接受静脉输液的左侧手臂血管微红,不肿,无斑疹,无渗出,呼吸困难,心悸。立即予以停药,测血压 125/75 mmHg,心律 100 次/min,嘱咐患者平躺。10 min 后,疼痛减轻,30 min 后症状完全缓解。

刺五加的药理作用广泛,特别对神经系统的作用肯定。刺五加注射液含有刺五加苷 A,B,C,D,E 及异秦皮定等,总含量 500 mg/250 ml。不同厂家的刺五加注射液在我院临床使用时间较长,不良反应轻微,个别病人因输注速度快而有轻微静脉刺激性和轻度头晕,均可忍受。减慢速度后,症状随即消失。本例患者在输注时出现一侧眼眶疼痛,剧烈头痛较为少见,我们分析与患者的神经系统对刺激的敏感性增高有关。因此,神经系统病变患者使用刺五加注射液时应注意防范其刺激性。

收稿日期:2000-01-25