

· 不良反应 ·

乳酸菌素片致血尿 1 例

刘 云(云和 323600 浙江省云和县人民医院)

患者,男,10个月,因发热、腹泻,来院就诊。经查给予10%葡萄糖注射液 250ml+10%氯化钠针 5ml+病毒唑针 0.1g,静脉点滴,每日一次,同时给乳酸菌素片(中美合资黑龙江乌苏里江制药有限公司)0.2g, Tid, po,当天晚即出现血尿。再次来院就诊,小便化验:红血球+++ ,被收治入院。给予生理盐水 5ml+青霉素钠 50万U,静脉注射,每日两次;10%葡萄糖注射液 250ml+ VitC 1.5g,静脉点滴,每日一次。两天后血尿消失,小便常规化验正常,因患儿大便稀,其自给

服乳酸菌素片 0.2g,约2小时后出现血尿,未经任何特殊止血处理,停药后血尿自行消失,继住院观察,两天后痊愈出院。

讨论:本例患者无既往药物过敏史,而乳酸菌素具形成肠道保护层,刺激肠道分泌 IgA 抗体,提高肠道免疫力,促进胃液分泌,增强消化功能等作用,一般无不良反应,此例服用乳酸菌素片致血尿,实属罕见,希引起临床注意。

收稿日期:2001-04-16