

乳康片致过敏性紫癜 1 例

刘景衍 金宝萍 王惠平 洪昆相¹ (昆明 650034 昆明市儿童医院; ¹ 昆明市第一人民医院内科)

患者女, 36 岁, 左乳腺外上方有 $2\text{cm} \times 3\text{cm}$ 大小的结节 1 月。月经前结节疼痛并略增大, 经后疼痛消失, 结节缩小, 诊断“乳腺小叶增生症”。既往无食物及药物过敏史。服陕西安康中药厂生产的乳康片, 每次 3 片, 每日 3 次。同时服西安正大制药有限公司生产的中成药平消胶囊。服上述药物半月后双下肢出现红色紫癜, 数量不多, 伸侧多见, 直径 $0.1\text{cm} \sim 0.4\text{cm}$, 略高出皮肤, 压之不退色。血小板正常。诊断过敏性紫癜。后经常忘记服上述药物, 经静脉点滴葡萄糖酸钙, 维生素 C 等, 7 天后紫癜逐渐消失。但数天后紫癜又出现, 乳康片少

服, 则紫癜出现较少, 如规则服药, 则紫癜增多, 双下肢密集分布。停药乳康片后, 近半年多紫癜未再出现。现仍继续服用平消胶囊。病后无关节疼痛, 无血尿, 血压正常。既往有胃区疼痛史, 服上述药物后疼痛未见加重, 无血便。现左乳腺结节大小同前, 治疗无明显效果。乳康片由黄芪、丹参、乳香、没药、浙贝、鸡内金等十多味中药组成, 其中何种成份引起过敏性紫癜尚难确定。

收稿日期: 2001- 04- 04