

脑复素注射液致药疹 1 例

李新芳 杨惠萍(伊犁 835000 新疆伊犁州友谊医院)

患者女, 9 岁。既往有癫痫病史, 一直服用 γ -氨基酪酸片。2 月 22 日因体热 38.2℃、鼻塞、头痛, 意识不清, 精神萎靡不振来我院神经内科就诊, 经检查后, 给予 0.9% NS 250ml + 20ml 鱼腥草注射液(四川升和制药厂), 10% GS 250ml + 10ml 脑复素注射液(黑龙江·江世药业, 批号 990525) 静滴, 口服 γ -氨基酪酸片。两种液体滴完半小时后, 患者浑身瘙痒, 全身皮肤、四肢可见红色斑丘疹, 有刺痛感。12h 后消失。第 2 天, 在静滴完脑复素后, 立即出现全身红疹, 有强刺痛感, 抓之出现风团, 体发热。立即送往医院皮肤科就诊, 确认为药物引起的药疹反应。静滴地塞米松针 5mg, 肌注扑尔敏针 10mg, 外用炉甘石洗剂, 2 天后症状缓慢消失。停用脑复素注

射液, 继续使用鱼腥草注射液, 未出现上述症状, 又因该患者长期服用 γ -氨基酪酸片未出现任何反应。故确认为该药疹反应由脑复素所致。

脑复素注射液是从动物脑组织中提取, 具广泛生物学活性, 可调节脑代谢的活性多肽类物质和氨基酸的灭菌水溶液, 能改善脑代谢, 益智提高记忆力。用于治疗脑血管病及其它脑疾病所引起的脑神经功能障碍, 可促进脑神经系统疾病康复, 在临床上已广泛使用, 很少有不良反应的报道。上述药疹反应笔者认为是一种荨麻疹药疹, 是一种异性蛋白的变态性反应, 应值得注意。

收稿日期: 2001-04-08