

脑复康注射液不良反应 1 例

胡中慧(兰州 830000 兰州军区乌鲁木齐总医院药局)

患者,女,55岁,近日四肢常有麻木感,经我院神经内科诊断为老年衰退综合症,医生给患者开脑复康注射液(湖南古汉集团股份有限公司,衡阳制药厂,批号 00071405)。当天中午患者在当地社区诊所输了一瓶脑复康注射液,回家后感到口干,燥热,有嗜睡感。家人扶持睡下后,沉睡 5h,(平时患者睡眠很轻,很容易惊醒),经家人反复叫方醒,醒后患者称口渴、头晕、身上瘙痒,家人发现其背部、腋窝、腹股沟出现片状红疹,红疹发硬,比皮肤高出少许,患者意识不清醒,仍然有嗜睡感。其被家人送入医院,经诊断为药物过敏。立即停药,临床观察,第四天后,患者红疹消退,嗜睡感消失,症状好

转,出院。

脑复康注射液是乙酰胺吡咯烷酮氯化钠注射液,主要作用是促思维记忆药,能抗大脑皮质缺氧,活化大脑细胞,增进磷质吸收与脑蛋白合成,加速脑半球间信息传递速度,可用于老年痴呆症、脑外伤、脑震荡、脑动脉硬化、脑血栓后遗症等。不良反应有口干、荨麻疹、胃纳减退等,但这例不良反应中出现的发硬红疹、意识不清及嗜睡现象很少见,应予以重视。

收稿日期:2001-07-19