

珍菊降压片致药疹 1 例

傅其涛 王慎鸿 陈 华(杭州 310006 浙江省中医院)

患者女,60岁,因患高血压病,在2001年12月16日,口服珍菊降压片(上海中药制药三厂,批号20010916)每日三次,每次一片,当晚感觉皮肤发痒,第二天出现全身搔痒和皮疹,躯干和四肢皮肤见粟粒样丘疹呈弥漫性分布,立即停药,同时以抗过敏治疗,2d后止痒,皮疹消退。因听人说,珍菊降压片不会引起过敏反应,在半个月后患者再次服用珍菊降压片,次日又出现全身皮疹和皮肤搔痒,停药并给服抗过敏药治疗,二天后即愈。

讨论:珍菊降压片为降血压之中成药,主要成份为野菊花膏粉、珍珠层粉、芦丁、盐酸可乐定、氢氯噻嗪,临床上用于

治疗高血压症。本人采用珍菊降压片治疗高血压症已有多,以往没有发现药疹反应。本例患者先后二次服用珍菊降压片,每次都在服药后出现过敏性皮疹,并排除其他因素引起皮肤过敏反应,故认为过敏性皮疹是由珍菊降压片所致。但是,在同一时期有许多高血压病人服用珍菊降压片,也为该厂生产,同一批号,但并未出现药疹,结合患者以往有青霉素、磺胺药物过敏史,故考虑本例药疹的发病可能与患者过敏体质有关。由于中成药成分复杂,难以确定为哪种成份所引起,其详细发病机理尚有待进一步探讨。

收稿日期:2002-01-08