

口服头孢克洛分散片致尿频 1 例

于志良 王卫卫(威海 264400 山东威海市文登中心医院)

患者女, 48 岁, 因睡眠打鼾伴夜间憋醒 3 年, 于 2000 年 11 月 18 日入院, 查体: 肥胖体型, 颈项短粗。咽腔狭窄, 软腭肥厚, 双扁桃体 III° 大, 心肺腹部正常, 血常规、尿常规、大便常规正常。肝肾功能心电图未见异常。入院后于 2000 年 11 月 20 日局麻下行悬雍垂腭咽成形术(UPPP)。术后予静滴青霉素并予止血敏等止血治疗。5d 后停用青霉素改口服头孢克洛分散片 0.25, tid(上海莱福制药有限公司生产, 批号 000603), 服药后患者自述尿频, 约 25~30min 一次, 无尿急, 尿痛。24h 尿量为 3100ml。饮食情况与以前无差别, 查尿常规中尿比重等各项指标均正常。尿细菌培养阴性, 肝肾功能无

异常, 服药 5h 后恢复正常, 再服此药后又出现尿频, 停药后一切恢复正常。遂予停药, 改肌注青霉素, 治愈出院。

头孢克洛为第二代头孢菌素, 其临床常见不良反应为过敏, 胃肠道反应及肝肾功能损害。肾功能损害通常表现为少尿, 蛋白尿, 管型尿。而本例表现为尿频, 多尿。各项检查指标均正常, 与常见报道有差别, 因服药 5h 后症状消失, 而头孢克洛半衰期为 0.6-0.9h, 分析为服药后头孢克洛代谢产物刺激有关, 详细原因不明。

收稿日期: 2002-01-10