

静滴参麦注射液引起过敏反应 1 例

虞信芬(宁波市北仑区郭巨卫生院,浙江 宁波 315814)

中图分类号:R994.11

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0013-01

患者女,71岁,在外院B超诊断为阑尾脓肿,来我院进行保守治疗,具体用药如下:丁胺卡那针0.4g加入5%葡萄糖液,0.5%灭滴灵针100mL给予静滴,因患者自诉乏力,纳差,后用参麦注射液(石家庄神威药业有限公司,批号0108091)20mL加10%葡萄糖液静滴,约3min后,患者即感觉胸闷,心悸,呼吸困难,出现面部皮肤潮红,唇、鼻尖发绀等现象。查体:血压12/8kPa,呼吸20次/min,心率110次/min,肺部听诊无殊,考虑为过敏反应所致,立即停止输液,静

推地塞米松针15mg,皮下注射肾上腺素0.5mg,0.5min后,患者即自觉好转,5min后恢复正常,后此组输液给正常人使用,未发现任何不良反应。

讨论:参麦注射液每10mL中含红参、麦冬各1g,现广泛用于气阴两虚或有心脏疾病的患者,不良反应未见报道,此类过敏反应发生快,症状危险,若不及时处理,即会引起严重后果。故提醒临床医师用该药时加以密切注意。

收稿日期:2002-03-18