

头孢菌素不良反应 2 例

冀秀芳,赵凤春(大同市第五人民医院,山西 大同 037006)

中图分类号:R978.11

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0019-01

患者 1,男,74 岁,主因患肺气肿、肺心病,急性加重一周,于 2002 年 3 月 18 日收住院。入院查体:体温 36℃,脉搏 104 次/min,呼吸 28 次/min,神清、气短,呼吸困难,颜面口唇紫绀明显,球结膜轻度充血水肿,双肺呼吸音低,可闻及散在干湿性罗音。入院诊断:慢性支气管炎急性发作,阻塞性肺气肿、肺心病、心衰 III,医嘱给予抗感染、祛痰、平喘、吸氧、超声雾化吸入等对症治疗,询问患者既往无青霉素过敏史,一年前曾输注头孢唑林钠加地塞米松 5 mg,5 d 后出现左侧面部麻木,感觉消失,停药后症状自行消失。本次改用头孢噻肟钠,用头孢唑肟先锋霉素 v 皮试阴性,当药物输入约 5 min 后患者感觉左眼周围有虫蠕感,随之向左眼周围扩散,左眼冒金花,以鼻梁为中心线左侧面部出现麻木,感觉逐渐消失,手触无感觉,除左面部出现此症状外其它部位无不适,立即终止输液后,症状逐渐消失。

患者 2,男,54 岁,主因上呼吸道感染于 2001 年 3 月 30

日入院。入院查体,体温 36.8℃,脉搏 86 次/min,呼吸 20 次/min,咽部充血明显,咳嗽,呼吸音粗,诊断上呼吸道感染,医嘱给予抗感染等对症治疗,询问患者既往无青霉素及头孢菌素过敏史,给予静脉点滴头孢唑林钠 6g,过敏试验阴性。当药物输注约 10 min 左右患者出现频繁打喷嚏,流眼泪(输液前无此症状),考虑与用药有关,因此立即终止输液后,症状逐渐消失。

讨论:头孢菌素不良反应多见于胃肠道反应,静脉炎、药疹。以上两种反应实属罕见。而且两位患者用药前过敏试验均为阴性。可见过敏试验阴性者也不一定就不出现过敏反应,由于人的个体差异过敏反应的表现也不同,这应该引起我们医护人员的高度重视,特别是首次用药,应严密观察患者有无全身及局部不良反应,才能更好地保障患者的用药安全。

收稿日期:2002-04-18