· 不良反应 ·

复方丹参注射液致过敏反应 2 例

德庆卓歌(青海省医学院附属医院小桥医院,青海 西宁 810003)

中图分类号:R286

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0077-01

患者 1,女,65 岁,因反复头痛、头晕、恶心等不适,来我院就诊,入院查体 T:36.6℃,P:81 次/min,R:18 次, BP:22/13kPa。心肺听诊无异常,诊断为原发性高血压。治疗予降压并给予 5%葡萄糖注射液 250 mL 加复方丹参注射液 20 mL,静脉滴注。约 5 min 后患者自感胸闷、心慌、全身发冷、寒颤。立即停用丹参注射液,给地塞米松 10 mg,20 min 后患者发冷、寒颤症状有所好转。

患者 2,男,71 岁,心慌、头昏、四肢无力,因症状加重入院。查体 T:36.8℃,R:82 次/min, BP:19/11kPa,神志清楚,双肺呼吸清晰,心律 82 次/min,律不齐,可闻及早搏约 16~20 次/min,无杂音。心电图示频发室性早搏,心肌缺血,诊(断为冠心病。给予普罗帕酮心律平)及 10%葡萄糖液 250 mL 加入复方丹参注射液 20 mL,静脉滴注。连续 2d 在静

滴复方丹参过程中出现寒颤、恶心、呕吐,肌注地塞米松注射液 10 mg 后症状逐渐减轻。

讨论:对同一批次的葡萄糖注射液进行检验未发现热源,患者既往均无家庭过敏史,考虑为复方丹参注射液的不良反应。复方丹参注射液每毫升相当于丹参、降香各 1g。丹参含脂溶性的多种丹参酮类及水溶性的原儿茶酚醛和儿茶酚的衍生物,具有活血化瘀,理气开窍,扩张冠状动脉,增加血流量,增加心肌收缩力,改善心肌功能,抵制凝血等作用。适用于心绞痛及急性心肌梗死,临床应用较广泛,不良反应少。在使用该药时应密切观察患者,如出现过过敏反应,应及时停药,对症处理,避免医疗事故的发生。

收稿日期:2002-02-04