

灯盏花素引起的不良反应 1 例

潘豫(兰州军区乌鲁木齐总医院专病中心,新疆 乌鲁木齐 830000)

中图分类号:R282.7

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0077-01

患者,女,56岁,于2001年6月10日以脑供血不足收入院,因自1996年起无明显诱因出现头晕、视物旋转,间歇性(发作,每次约数分钟,可自行缓解,曾口服氟桂利嗪西比灵)出现过全身瘙痒,停药后缓解。入院后遵医嘱输注生理盐水250 mL加灯盏花素50 mg,60滴/min,每日1次。6月11日晚肌注维生素B₁ 0.1 g,维生素B₁₂ 1 mg,40 min后四肢关节出现少量皮疹。6月12日,停用维生素B₁、维生素B₁₂,皮疹增多同时伴瘙痒、针刺感,口服氯苯那敏(扑尔敏)4 mg,效果不佳,患者入睡困难。6月13日静推10%葡萄糖10 mL加10%葡萄糖酸钙10 mL早、晚各1次,同时口服扑尔敏4 mg每日3次,仍未见明显效果。6月14日停用灯盏花素,遵医嘱10%葡萄糖10 mL加入10%葡萄糖酸钙10 mL加地塞米松10 mg加维生素C 1.0静推每日1次。6月15日皮疹减少,渐退,考虑为灯盏花素引起的不良反应,但又不排除维生素

B₁、维生素B₁₂的可疑性。6月20日再一次使用生理盐水250 mL加灯盏花素50 mg静滴每日1次,输液过程中未出现不适及皮疹。22日上述症状再次出现,即停药,对症处理,2d后皮疹消退,出院。

讨论:注射用灯盏花素(湖南省湘衡制药厂出品,批号ZZ-5853-湘卫药准字<1994>第024049号)是目前用于改善脑微循环,增加脑血流量,提高血脑屏障通透性,溶血栓的药物之一,它的主要成分是4-5,6-三羟基黄酮-7-O-葡萄糖醛酸苷,因其可透过血脑屏障,故对中枢神经及周围神经的代谢有显著作用,它的不良反应为偶见全身发痒、胸闷、乏力、皮疹、心悸等现象。本例患者出现不良反应的原因可能和过敏体质有关。

收稿日期:2002-03-11