

鲜益母草胶囊用于药物流产后 5913 例临床总结

龚菊莲,楼莲娟(浙江义乌市妇幼保健院,浙江 义乌 322000)

中图分类号:R287;R719.31 文献标识码:B 文章编号:1007-7693(2003)03-0254-01

1 临床资料

1.1 一般资料:2000 年 6 月至 2002 年 12 月应用米非司酮加米索前列醇口服药流共计 10562 例,用鲜益母草胶囊治疗 5923 例。孕妇年龄 16~45a,孕次 1~5 次,产次 0~2 次,孕期 35~90d。其中药流不全 551 例;疤痕子宫 672 例;≥3 次流产 1187 例;合并子宫肌瘤 29 例。

1.2 用法:绒毛排出当天予鲜益母草胶囊(浙江大德制药有限公司生产,每丸 0.4g)2 粒,tid,连服 1 wk;用药当天及术后 1 wk 常规 B 超检查,需清宫者术毕当天起续服 3~7d。

1.3 观察指标

①阴道出血:为最主要指标。②腹痛。③药流不全。④其他:发热,腹胀,腰痛,乏力等不适症状。

1.4 疗效判定

痊愈,服药 1 wk 内主要症状消失;显效:服药 7~15d,主要症状消失;有效:服药 7~15d,基本无阴道出血,其他症状明显改善;无效:服药半月,仍有阴道出血及/或其他症状。

2 结果

表 1 5913 例用药总结果

Tab 1 Effect of take medicine of 5923 cases

		痊愈	显效	有效	无效
总数	例数	3841	1778	192	102
5913 例	比例(%)	64.85	30.02	3.24	1.72
疤痕子宫	例数	501	62	87	22
672 例	比例(%)	74.55	9.23	12.59	3.27
≥3 次流产	例数	802	197	113	75
1187 例	比例(%)	67.57	16.60	9.52	6.32
合并子宫肌瘤	例数	18	6	3	2
29 例	比例(%)	62.07	20.69	10.34	6.90
药流不全	例数	89	18	19	13
139 例*	比例(%)	64.96	13.14	13.87	9.49

组织排出当天行 B 超检查,组织残留 551 例。组织残留较多者当天清宫计 97 例,术后单服鲜益母草胶囊,全部 1 wk 内止血。454 例少许组织残留者,服用鲜益母草胶囊,1 wk 后 B 超复查示 317 例宫腔已清晰,阴道流血明显减少;部分患者肉眼见蜕膜样组织排出。仍有组织残留 137 例,予清宫,术后继续服药 3~7d,治愈 89 例(64.96%),显效 18 例(13.14%),见表 1。

3 讨论

3.1 药流后阴道出血时间较长和出血量较多是其主要副反应,术后加用各种药物直至今日尚无肯定,有说服力的疗效,临床资料表明,药物流产后平均出血时间为半个月左右,其主要原因为绒毛或滋养细胞残留。

3.2 益母草全草性微寒,味苦、辛,有活血调经,清热解毒消肿,祛瘀生新之功效,特点为行血而不伤血,养血而不留瘀。因其具有子宫收缩作用常用于产后瘀滞腹痛、恶露不尽等,可单用。临床常用制剂有鲜益母草胶囊,益母草流浸膏,益母草冲剂等。鲜益母草胶囊为中药益母草的单味制剂,为化瘀养血之剂,与其他制剂相比,临床服用更为方便,患者更容易接受。

3.3 鲜益母草胶囊用于药物流产后治疗,总有效率达 98.11%,尤其对少许组织残留、疤痕子宫、多次流产者不但止血效果好,且促进子宫收缩,促使组织排出,大部分可免受清宫痛苦,疗效确切。建议作为药流后常规用药。

收稿日期:2003-03-17