

安痛定致小儿剥脱性皮炎 1 例

陈晓青,胡秀荣,陈琍(河北医科大学附属三院,河北 石家庄 050051)

中图分类号:R971.1

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)03-0255-01

患儿女,16个月,因皮疹2d,皮肤片状剥脱1d入院。于入院前2d患儿因咳嗽、发热,在本地诊所给予安痛定2mL肌注后,口鼻、颈部、躯干出现大量红色皮疹,伴痛疼、搔痒、烦躁哭闹。按“过敏性皮疹”给予维生素C和马来酸氯苯那敏等药物治疗,未见好转。入院前1d,皮疹融合成片,并有大片皮肤剥脱。查体: $T37.7^{\circ}\text{C}$,神志清楚,精神差,颜面潮红、浮肿,口唇及口腔黏膜充血糜烂,周身皮肤鲜红肿胀,有大片皮肤剥脱,周围有渗液及水疱。手心、足底有多个水疱,周围红肿。入院后按“剥脱性皮炎型药疹”,给予甲泼尼松龙、葡萄糖酸钙、维生素C、克敏等药物治疗,皮肤剥脱处逐渐干燥

结痂,无新皮疹出现,住院10d,痊愈出院。

讨论 安痛定作为一种解热镇痛药,由于其价格便宜,退热迅速,曾在临床广泛应用,尤其是基层医疗单位更是作为退热之首选。

公认的不良反应为偶能致粒细胞减少症,亦有引起荨麻疹的报道,引起剥脱性皮炎尚属罕见,应引起医务工作者高度注意,在儿科临床尽量少用或不用,并应严格掌握用药剂量,以防严重后果发生。

收稿日期:2002-10-23