

华蟾素注射液致过敏反应 1 例

江忠贵(浙江省乐清市第三人民医院,浙江 乐清 325604)

中图分类号:R944.1 文献标识码:B 文章编号:1007-7693(2003)04-0310-01

患者,男,38岁,因乙型肝炎,于2002年6月5日收入院,查体:T37.5℃,P85次/min,R19次/min,BP104/72mmHg,6月7日给予华蟾素注射液(安徽金蟾生化股份有限公司,批号010805)20mL加5%葡萄糖(广东大冢制药有限公司,批号020202)500mL静脉滴注,患者以往均无过敏史。当滴注20min后,患者出现畏寒、颤抖,继而恶心、呕吐、面部苍白、表情呆板。体检:T41.3℃,P112次/min,R24次/min,BP70/40mmHg。立即停用华蟾素,给予10%葡萄糖250mL加DXM5mg,654-210mg,多巴胺60mg静滴,同时静推10%葡萄糖酸钙10mL,肌注复方氨基比林2mL,30min后

症状逐渐好转,观察2h后恢复正常。

华蟾素注射液有明显的抗肿瘤和抑制乙肝病毒复制作用,主要用于中、晚期癌症及乙型肝炎患者。该患者在使用华蟾素注射液前无不良反应,停药后亦无类似反应出现,考虑此反应为华蟾素注射液所致。故希望临床用此药时除了应该严格掌握药物剂量、输液浓度、滴注速度还应密切观察药物过敏反应的发生。一旦发生过敏反应,应立即停药并采取相应的抗过敏措施,以保证患者的用药安全,减少医疗纠纷。

收稿日期:2002-09-25