

香药胃安胶囊致全身药疹 1 例

谢少玲 玉从容 郑建华(武警广东省总队医院;广州 510507)

中图分类号:R286

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)05-0431-01

患者女,35岁,2002年5月10日晚11时,因胃痛自服香药胃安胶囊(安徽高山药业有限公司,批号020328)3粒。3h后患者皮肤出现潮红、搔痒,四肢、躯干见大量散在红色斑丘疹。患者未予重视,约2h后,皮疹及皮肤搔痒逐渐减轻,次晨自行恢复正常。5月11日患者再次服用香药胃安3粒,又出现上述症状,且红色斑丘疹分布较前密集,程度较前加重。患者遂来院就诊。拟诊为香药胃安过敏,停用香药胃安,给50%葡萄糖注射液20mL,加10%葡萄糖酸钙10mL,维生素C2g,iv,qd,马来酸氯苯那敏4mg,po,tid。2h后皮疹全部消退,皮肤恢复正常。之后换用胃乃安胶囊继续治疗,

随访未再出现上述不良反应。

讨论:本例患者在服用香药胃安胶囊后出现皮疹,其间患者未用其它任何药物,再次服用香药胃安又出现类似症状,且较前加重。停药,经抗过敏治疗后皮疹消退。故认为药疹为香药胃安胶囊所致。

香药胃安胶囊主要用于治疗胃溃疡,胃窦炎等,应用以来不良反应少见,偶见眩晕及消化道反应。而该药引起全身药疹,作用未见国内文献报道,其机制不明,有待同行探讨。

收稿日期:2002-07-08