

他巴唑片致迟发性过敏反应 2 例

王莉,宋学立(解放军 148 医院,淄博 255300)

中图分类号:R977.14

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)05-0433-01

患者,女,38岁,2002年2月27日因甲状腺机能亢进3月入院。入院查体:BP135/75 mmHg(18/10 kPa),P96次/min,T36.9℃,无药物过敏史。于28日给予甲巯咪唑(他巴唑,上海黄海制药有限责任公司,生产批号:010747)15 mg,tid,po,普萘洛尔(心得安)10 mg,tid,po。一周后患者发现手臂相继出现淡红色丘疹,继日,全身皮肤遍布紫红色片状红斑,双前臂及胸背部已融合成片,奇痒难忍。随即停药,并 po 阿司咪唑(息斯敏)10 mg,qd,外用复方炉甘石洗剂搽洗,次日症状有所改善,5日后皮疹完全消退。此后继续服用心得安,并改用 po 丙硫氧嘧啶治疗,再无异常情况发生。

患者,女,27岁,2002年2月21日因甲状腺机能亢进1月入我院治疗,入院体检:BP120/67.5 mmHg(16/9 kPa),P92次/min,T36.5℃,无药物过敏史。于当日给予他巴唑(厂家、批号同上)10 mg,tid,心得安 10 mg,tid,Po。患者10d后发现

四肢及面部相继出现淡红色丘疹,继日全身皮肤遍布紫红色片状红斑,伴瘙痒。立即停药,并 po 马来酸氯苯那敏(扑尔敏)8 mg,tid,外用复方炉甘石洗剂搽洗,次日症状有所改善,3日后皮疹完全消失。此后再继续服用心得安 10 mg,tid,并改用 po 丙硫氧嘧啶治疗,再无异常情况发生。

2位患者在使用他巴唑过程中出现片状红斑、皮疹等迟发性过敏症状,而停药后则症状消失,故可确定这是他巴唑所致的不良反应。他巴唑治疗甲状腺机能亢进症疗效良好,临床应用较为广泛。他巴唑的不良反应为白细胞及粒细胞减少症,服药期间应定期检查血象,而他巴唑致迟发性过敏反应则报道较少,随着该药使用率的增高,过敏反应的发生也将增加,所以提请临床使用该药时给予注意。

收稿日期:2002-06-13