克拉霉素片剂人体生物利用度研究

高科攀, 史振祺, 蒋新国(复旦大学药学院药剂学教研室, 上海 200032)

摘要:目的 对国产克拉霉素片进行相对生物利用度研究, 评价其生物等效性, 为临床用药有效性提供实验依据。方法 48 名健康志愿者随机交叉单剂量口服 500 mg 克拉霉素试验制剂和参比制剂, 采用微生物检定法测定血药浓度, 生物等效性采用三因素方差分析和双单侧 t 检验。结果 试验制剂和参比制剂的药物动力学参数 $C_{\max}$, $T_{\max}$, $T_{1/2}$, $AUC_{0-\infty}$ 分别为 $(3.16 \pm 0.71) \mu\text{g}/\text{mL}$ 和 $(3.01 \pm 0.87) \mu\text{g}/\text{mL}$, $(1.46 \pm 0.59) \text{h}$ 和 $(1.72 \pm 0.57) \text{h}$, $(5.45 \pm 0.98) \text{h}$ 和 $(5.49 \pm 1.28) \text{h}$, $(26.22 \pm 4.26) \mu\text{g} \cdot \text{h}/\text{mL}$ 和 $(25.50 \pm 5.29) \mu\text{g} \cdot \text{h}/\text{mL}$ 。试验制剂的相对生物利用度为 $(106 \pm 20) \%$ 。结论 两种制剂具有生物等效性。

关键词: 克拉霉素; 生物利用度; 生物等效性; 微生物管碟检定法

中图分类号: R978.15; R945.1 文献标识码: A 文章编号: 1007-7693(2004)01-0038-03

Studies on the bioavailability of clarithromycin tablet in human

GAO Ke-pan, SHI Zhen-qi, JIANG Xin-guo(Department of Pharmaceutical Science, School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai 200032, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To study the relative bioavailability of domestic clarithromycin tablet, evaluate its bioequivalence so as to make better clinical use of it. **METHOD** Forty-eight healthy volunteers were orally given domestic clarithromycin tablet(test preparation) and imported tablet(reference preparation) with a single dosage of 500 mg in a randomized crossover study. The serum concentrations of clarithromycin were determined by microbioassay. The bioequivalence was evaluated by three factors analysis of variance and two one-side t test. **RESULTS** The pharmacokinetic parameters of test or reference preparation were as follows: $C_{\max}$: $(3.16 \pm 0.71) \mu\text{g}/\text{mL}$ or $(3.01 \pm 0.87) \mu\text{g}/\text{mL}$, $T_{\max}$: $(1.46 \pm 0.59) \text{h}$ or $(1.72 \pm 0.57) \text{h}$, $T_{1/2}$: $(5.45 \pm 0.98) \text{h}$ or $(5.49 \pm 1.28) \text{h}$, $AUC_{0-\infty}$: $(26.22 \pm 4.26) \mu\text{g} \cdot \text{h}/\text{mL}$ or $(25.50 \pm 5.29) \mu\text{g} \cdot \text{h}/\text{mL}$. The relative bioavailability of test preparation was $(106 \pm 20) \%$. **CONCLUSION** The two preparations were bioequivalent.

KEY WORDS: clarithromycin; bioavailability; bioequivalence; microbioassay

克拉霉素为大环内酯类抗生素, 具有类似红霉素的抗菌效果, 对多种革兰阳性或革兰阴性, 需氧或厌氧菌均具很高的抗菌效果, 在国外已广泛应用于临床。本实验用微生物管碟检定法^[1-2]测定 48 名健康志愿者单剂量口服国产克拉霉素片剂后的血药浓度, 为临床安全有效用药提供实验依据。

1 材料和方法

1.1 仪器与试剂

Millipore simpli lab 超纯水净化器, NUAIRE 隔水式二氧化碳培养箱

pH7.8 磷酸盐缓冲液; 短小芽孢杆菌 [CMCC(B) 63202] 中华人民共和国卫生部标准(试行) WS-279(X-241)-96] 由上海市药品检验所提供; 培养基 I(2000 年版药典附录); 克拉霉素试验制剂(上海雅培制药有限公司, 250 mg/片, 批号: 991017); 克拉霉素参比制剂(意大利雅培药厂, 250 mg/片, 批号: 010417); 克拉霉素标准品(美国雅培制药有限公司提供, 含量: 99.0%, 批号: 33386-255-3-B)

1.2 受试者

健康男性 48 名, 年龄 (21.2 ± 1.2) 岁, 身高 $(1.73 \pm$

$0.05) \text{m}$, 体重 $(65.19 \pm 5.86) \text{kg}$ 。经病史询问, 并经肝肾功能、血常规和心电图检查证实为健康受试者, 志愿参加克拉霉素片剂的人体生物利用度试验, 并于受试前签署受试者知情同意书。受试者在整个试验过程中精神状态良好。

1.3 给药方案

将 48 名受试者随机分成 2 组, 进行自身交叉单剂量口服给药。给药前禁食 12h 后口服试验制剂或参比制剂 2 片(250 mg/片), 用 250 mL 温开水送服, 服药后 2h 方可饮水, 4h 后进低脂肪统一午餐, 晚上也给统一餐。受试者服药后避免剧烈运动。试验期间禁烟酒和含咖啡因的饮料, 受试前两日至试验结束禁服任何其它药物。两次给药间隔为 7d。

1.4 血样采集与处理

血样采集前, 埋置肝素留置针头, 服药前取空白血, 并分别在给药后 0.33, 0.67, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 24h 共 12 个时间点取静脉血 3.0 mL, 收集于聚丙烯离心管内, 离心 15 min (3 000 r/min) 后分离得血清, 于 $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 冰箱中放置, 待作血药浓度分析。

1.5 血药浓度测定

1.5.1 标准血清样品配制 参考文献[3]方法,精密称取克拉霉素标准品 5.0 mg,10 mL 甲醇溶解后,用 pH7.8 的灭菌磷酸缓冲液定容至 50.0 mL 量瓶中,作为标准贮备液(浓度为 100 μ g/mL),置 4 $^{\circ}$ C 冰箱保存备用。取储备液适量,用血清稀释成 0.05,0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 μ g/mL 系列浓度,作为标准血清样品,于 -20 $^{\circ}$ C 冰箱中放置。另配 1.0 μ g/mL 血清溶液作中心浓度样品用于校正碟内误差。

1.5.2 双碟的制备 取配制好的培养基适量,加热融化,待温度下降至 60 $^{\circ}$ C,以 1:5 000 的比例加入菌液,摇匀,在每个双碟中分别加入 10 mL,形成培养层。在每碟中以等距离均匀安放无菌不锈钢小管 6 个,备用。

1.5.3 标准曲线制备 将 -20 $^{\circ}$ C 保存的系列标准血清样品和中心浓度样品于室温下融化,振摇 10s。在每个双碟中用移液枪将同浓度的 3 个标准血清样品和 3 个中心浓度样品滴入不锈钢小管中(两两间隔),加样量为 100 μ L,并以此平行操作 3 份。所有浓度的标准血清样品均照上述操作。将双碟置恒温箱内 37 $^{\circ}$ C 培养 15~16h,取出,用游标卡尺分别测量抑菌圈直径(精确至 0.02 mm)。先求中心浓度抑菌圈直径平均值 d_1 ,再求样品抑菌圈直径平均值 d_2 。两者之差为 Δd 。以平均 Δd 值为横坐标,标准血清浓度的对数为纵坐标作线性回归,作图即得标准曲线。

1.5.4 血药浓度测定

以受试者血清样品取代标准血清样品,按相同的方法测算平均 Δd 值,代入标准曲线方程算得受试者血清药物浓度。

1.5.5 数据处理

根据药时数据,用梯形法计算 AUC,以实测值表示 T_{max} 和 C_{max} ,采用统计矩方法计算其它药动学参数。用 SPSS 软件将 C_{max} , AUC_{0-T} , $AUC_{0-\infty}$ 的值进行对数转换后再进行方差分析,并用双单侧 t 检验进行生物等效性判定,计算 90% 的置信区间。

2 结果

2.1 线性与灵敏度

标准曲线如图 1,标准曲线方程: $y = 0.3187x + 0.2721$ ($r = 0.9986$, $n = 8$),线性范围:0.05~6.4 μ g/mL,最低检测浓度为 0.05 μ g/mL。

图 1 标准曲线图

Fig 1 Standard curve of $\ln C$ versus average Δd

2.2 回收率与精密度

取 0.1,0.8,3.2 μ g/mL 的标准血清样品,每一浓度取 5 份,按血药浓度测定方法重复测定,以测定浓度除以配置浓度得回收率,分别为 (109.40 $\pm$ 16.95)%, (104.60 $\pm$ 11.15)% 和 (101.40 $\pm$ 13.89)%; 同 1d 内测定低、中、高浓度各 5 份样品,计算测定浓度的 RSD,即为 1d 内 RSD,分别是 19.12%,10.02% 和 6.99%; 连续的 5d 测定低、中、高浓度各 5 份样品,测定浓度的 RSD,即为 1d 间 RSD,分别是 14.05%,9.63% 和 7.03%。

2.3 血药浓度测定

受试者血清样品按照上述方法测定,绘制药时曲线如图 2。

图 2 受试者口服试验制剂和参比制剂血药浓度平均值-时间曲线

Fig 2 Plasma concentration-time curve of clarithromycin after p.o. administration of test preparation and reference preparation

2.4 主要药动学参数及统计结果

结果见表 1。

表 1 主要药动学参数及统计结果 ($n = 48$, $\bar{x} \pm s$)

Tab 1 Main pharmacokinetic parameters and statistical results ($n = 48$, $\bar{x} \pm s$)

参数	试验制剂	参比制剂	P 值
T_{max} (h)	1.46 $\pm$ 0.59	1.72 $\pm$ 0.57	> 0.05
C_{max} (μ g/mL)	3.16 $\pm$ 0.71	3.01 $\pm$ 0.87	> 0.05
$t_{1/2}$ (h)	5.45 $\pm$ 0.98	5.49 $\pm$ 1.28	> 0.05
AUC_{0-T} (μ g/mL $\cdot$ h)	24.92 $\pm$ 4.04	24.08 $\pm$ 4.91	> 0.05
$AUC_{0-\infty}$ (μ g/mL $\cdot$ h)	26.22 $\pm$ 4.26	25.50 $\pm$ 5.29	> 0.05
MRT (h)	6.99 $\pm$ 0.69	7.28 $\pm$ 0.92	> 0.05
F	1.06 $\pm$ 0.20		

3 结论

方差分析和双单侧 t 检验的结果表明:试验制剂的 AUC_{0-T} , $AUC_{0-\infty}$, C_{max} , T_{max} , $T_{1/2}$ 与参比制剂相比,均无显著性差异。试验制剂的 AUC_{0-T} 和 C_{max} 90% 置信区间分别落在参比制剂 100.01%~109.18% 和 94.65%~112.99% 的范围内,故试验制剂与参比制剂生物等效。试验制剂平均相对生物利用度为 (106 $\pm$ 20)% (以 AUC_{0-T} 计算)。

4 讨论

微生物检定法双碟的制备通常是先铺 20 mL 无菌培养基作为底层,再在其上覆盖 5 mL 含菌培养基,但如此制备灵敏度往往较低。本实验仅以 10 mL 含菌培养基铺单层,同时控制培养基中短小芽孢杆菌含量,从而增加了方法灵

敏度。需要注意的是,先铺底层的方法可以克服由于培养皿底部不平整引起的碟内误差,而铺单层则无此效果。因此建议选择底部平整的优质培养皿用作铺单层。同时良好的恒温培养箱也是抑菌圈圆整清晰关键,尤其在低浓度测定中。

除上述双碟制备方法与相关文献报道有所不同以外,在数据统计分析中,由于受试者数量为 48 名,常用的 3P97 软件无法处理如此大量的数据,因此本实验使用 spss 软件,未对药时数据进行拟合,所有药动学参数均由实测数据得到,这些参数与文献报道基本一致。

致谢:感谢上海市药检所史晓晔、黄泓老师给予实验指导。

参考文献

- [1] 宋洪杰,李珍,石晶,等. 克拉霉素胶囊和片剂的生物利用度比较[J]. 中国临床药学杂志. 1999,8(6):354.
- [2] 魏倩萍,周兴华,何海霞,等. 克拉霉素胶囊人体相对生物利用度实验研究[J]. 重庆医科大学学报. 1999,24(2):161.
- [3] 黄海华,钟大放,王爱民,等. 克拉霉素两种制剂的生物等效性研究[J]. 中国抗生素杂志. 1998,23(3):209.

收稿日期:2002-09-12