

复方降压片致子宫肌瘤 1 例

任汉学(江苏省南通市第一人民医院,江苏 南通 226001)

中图分类号:R737.33

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)01-0028-01

患者,女,67岁,自1986年确诊为高血压病后,一直服用复方降压片,每日三次,每次二片,共服用了15年,至因出现阴道出血而就诊,体检:T:37.0℃,P86次/min, BP20/13kPa,心肺无殊,肝脾未及,神经系统检查没有发现阳性反应。眼底检查:视网膜动脉硬化Ⅱ,B超检查提示:有10cm×7.5cm子宫肌瘤。停止服用复方降压片,改为服用尼莫地平,一个月出血症状消失,六月后复检B超提示:有5cm×3cm子宫肌瘤。二年后B超检查提示:未发现子宫肌瘤。

讨论:复方降压片中主要含有利血平,长期使用可引起男性女性化,乳房胀大、乳溢、阳萎等与雌激素有关的不良反应,传统观点认为,雌激素是子宫肌瘤生长的主要促进因素。近年研究表明:雌激素也是子宫肌瘤发生的启动因子,在肌瘤的发生发展中具有重要作用,雌激素的拮抗剂可使肌瘤萎缩,长期使用复方降压片可能引发子宫肌瘤,一旦停用,雌激素水平降低,而子宫肌瘤消失。

收稿日期:2003-04-01