

紫丹活血片致过敏反应 1 例

翁文忠(福建省福清市医院,福建 福清 350300)

中图分类号:R969.3;R287

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)04-0283-01

患者,女性,70岁,于2003年11月7日出门坐三轮车时不慎从车上跌下,左大腿及腰部疼痛,当时不能行走,7d后(11月14日)到我院骨科就诊,查左髋部压痛,骨盆片无异常,给予“紫丹活血片”2盒(云南天利药业有限公司生产,批号030401),每天服3次,每次2片。于当日晚饭后服用2片,0.5h后全身皮肤出现瘙痒,患者不明原因,于当夜洗澡1次,但整夜瘙痒未除。于次日早餐后又服用2片,1h后面、颈、背部皮肤渐出现小片状红斑,并向下发展,2d后遍及全身,皮肤潮红,瘙痒加重。由于行动不便,于11月17号才到我院皮肤科就诊,诊断为“药疹”,给予斯诺平、酮替芬、西咪替丁(甲氰咪呱)等抗组胺药及泼尼松口服(5mg tid),1周后瘙痒减轻,但全身皮肤开始广泛脱屑,以手足部位为重,并出现低、中度发热,来我院皮肤科就诊,查血Rt:白细胞总数 $10.7 \times 10^9/L$,N:78.6%,诊断为“剥脱性皮炎型药疹”,继续抗组胺药及激素治疗,加用抗炎药:左克0.2, bid,于12月9号双下肢出现水肿,发热未除,于12月12日收住中医科。入院后查血生化:总蛋白51g/L,白蛋白27g/L,肝功能:碱性磷酸

酶254U/L,谷丙转氨酶61U/L,门冬氨酸转移酶71U/L,钾:3.31mmol/L,血Rt:白细胞总数正常,淋巴细胞12.9%,中性粒细胞79.2%。入院后予激素(地塞米松10mg/d,静滴,一周后递减),小剂量保钾利尿剂,纠正低蛋白血症,抗生素、保肝、口服抗组胺药及其它对症处理,中药辩证施治(增液汤合益胃汤加减),于12月19日起双下肢肿逐渐消退,全身症状缓解,无发热,于12月31日症状痊愈而出院。

紫丹活血片,曾用名“活血王”,主要成分为三七总皂苷、紫丹参,具有活血化瘀、理气止痛等功效,适用于冠心病、心绞痛、脑动脉硬化症、外伤疼痛等出现气滞血淤证候者,临床应用较广泛,但引起象本病历这样如此严重过敏反应者未见报道。该患者自诉既往无药物过敏史,此次外伤后仅服用紫丹活血片共4片,故过敏反应考虑为该药所致。鉴于目前中成药在临床应用日益增多,且偶有过敏反应出现,谨报道此例,以提醒同道在临床应用时予以警惕,嘱咐患者用药后如有不适,应即时到医院就诊,以免出现不良后果。

收稿日期:2004-01-12