

清开灵致低钾 1 例

安瑞芬,路其龙(新疆伊犁州新华医院内一科,新疆 伊犁 835000)

中图分类号:R591.11

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)06-0450-01

患者,男性,30岁,于2004年4月5日因咽痛、发热去私人诊所就诊,给予清开灵注射液,当晚出现疲乏,四肢软弱不能抬起,轻度呼吸困难,咳嗽无力等症状,第二天早晨来我科收住。查体:T:36.4℃、P:100次/min、R:20次/min、BP:120/80 mmHg。精神差,咽充血,双侧扁桃体Ⅱ°肿大,双肺呼吸音清,心率100次/min,律齐,心音有力,各瓣膜听诊区未闻及杂音,双上肢肌力Ⅲ级,双下肢肌力Ⅱ级,双侧膝腱反射减弱,双侧病理征(一)4月7日生化:血钾2.34 mmol/L,心电

图示:各导联T波低平,诊断低钾血症,给予补钾9g/d,3d后症状完全缓解,肌力恢复正常,复查血钾4.20 mmol/L,该患者三月前曾因咽痛在同一家诊所输清开灵,晚上亦有疲乏无力,四肢软弱症状出现,未治疗,2~3d后症状自行缓解,据症状分析符合低钾血症。该患者两次输清开灵后均出现低钾血症,而在输液前后均无致低钾原因,可以肯定低钾与输清开灵有关,其发生机制尚不清楚,望临床医生予以重视。

收稿日期:2004-07-03