

止血敏引起过敏反应 1例

陈素花,李文军 (河北省昌黎县人民医院,河北 昌黎 066600)

中图分类号: R973.1

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2005)04-0297-01

患者,女,74岁,因车祸伤及右上臂、左肘部,伤后右上臂活动受限,双上肢、左腰部疼痛,伴有血尿。诊断为左肾挫伤;右肱骨骨折。但患者强烈要求出院。6d后因病情未见明显好转而又返回住院治疗。给予止血敏(扬州中宝制药有限公司,规格 2mL:0.5g,批号:0207192)2.0g加入 5%葡萄糖注射液 500mL中静滴,每日 1次,d2输液结束后进针手臂轻微瘙痒。d3静滴止血敏约 1h后输液手臂瘙痒,出现荨麻疹,进而自觉周身不适、胸闷、呼吸困难。立即停药,给予非那根

25mg肌注、氟美松 5mg肌注、吸氧,40min后症状逐渐缓解。

止血敏临床使用多年,不良反应较少见,本例患者用药比较单纯,且过敏反应初时较轻,随着继续用药过敏症状不断加重,以致引起全身不适、胸闷、呼吸困难。故可确定过敏反为止血敏所致。因此,提醒医务工作者,在使用止血敏时应密切观察,一旦提示有过敏反应存在,应及时停药,以免过敏症状加重发生意外。

收稿日期:2004-12-30