

氟罗沙星静脉滴注致过敏性休克 1例

林柳卿 (福建省南平市第二医院药剂科,福建 南平 354200)

中图分类号: R969.3

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2006)04-0314-01

患者女,40岁,于2005年10月22日因右手食指电锯伤经清创处理后,给予氟罗沙星注射液(商品名:护康,扬子江药业有限公司生产,批号20040701,2mL:0.1g)0.2g加入生理盐水100mL中静脉滴注,输液35min后即输液量余20mL左右时,患者突然出现神志不清,呼之不应,口唇及颜面发绀,四肢冰冷,呼吸急促,脉搏细速,血压测不到,立即停止输入氟罗沙星,更换输液器,输入10%葡萄糖500mL,并给予吸氧,地塞米松10mg静脉推注,15min后神志朦胧,血压:120/70mmHg,脉搏:90次/min,心律齐,双侧瞳孔等大等圆,对光反射存在,双肺呼吸音清;30min后患者神志清楚,血压:124/76mmHg,住院观察24h患者无特殊主诉,于2005年10月23

日出院。

讨论

氟罗沙星为第三代喹诺酮类广谱抗生素,其不良反应以胃肠道及中枢反应较多见,快速静滴时可出现血管周围皮肤瘙痒及疼痛等,发生过敏反应者较罕见。本例患者出现过敏反应,经抗过敏治疗后症状缓解。因而,喹诺酮类药物的应用,其过敏反应的发生是不容忽视的。同时应严格掌握抗生素的适应症,用药前必须详细询问患者有无过敏史,用药过程中应注意控制输液速度并且严密观察病情变化。

收稿日期:2006-02-27