

阿奇霉素致过敏性休克 1例

施文艳,嵇月娥(江苏职工医科大学,南京 210029)

中图分类号:R978.15

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2007)01-0027-01

患者女,26岁。因咳嗽、流涕伴发热入院就诊,诊断为上呼吸道感染。给予注射用乳酸阿奇霉素(里奇,扬子江药业集团有限公司生产,批号为05082701)加入500mL 5%葡萄糖静脉滴注。给药数分钟后,患者出现头晕、眼花、胸闷、面色苍白等症状。体检示:神志尚清, BP 7.5/4.5 kPa, HR 105次/min。诊断:过敏性休克。采取立即停用里奇,让患者平卧,同时给予肾上腺素、地塞米松加氯化钠推注等措施,休克症状迅速缓解。30min后患者神清, BP 13/9 kPa, HR 78次/min,头晕、眼花、胸闷等症状消失。患者曾因感染多次口服过红霉素、罗红霉素等抗生素,未见不适。患者有青霉素过

敏史。

讨论:里奇为新大环内酯类抗生素,其抗菌谱与红霉素相似,临床常用于敏感菌引起的呼吸道、泌尿道感染,也可用于青霉素过敏的患者。患者有口服大环内酯类抗生素史,未出现口服不良反应,而静脉滴注引起过敏性休克,很可能与制剂中杂质及患者的特异体质有关。阿奇霉素的不良反应发生率较红霉素低,有胃肠道反应及偶见肝功能异常与外周血白细胞下降等,但过敏性休克尚未见文献报道,建议临床医生用药时引起注意。

收稿日期:2006-07-06