

华佗再造丸致腹痛 1例

张斌(南京大学医学院附属鼓楼医院,南京 210008)

中图分类号: R969.3

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2007)02-0168-01

患者女, 58岁。因头昏反复发作 2月余, 时伴耳鸣, 双手发麻, 有高血压病史, 2006年 1月来院就诊, 查体: BP 142/86 mmHg, 血液生化检查血清总胆固醇 6.20 mmol/L、三酰甘油 2.22 mmol/L和高密度脂蛋白胆固醇 0.90 mmol/L, 经频多普勒超声检查发现脑动脉主要分支的流速、流向改变, 血管腔狭窄, 初步诊断为脑动脉硬化, 服用华佗再造丸治疗, 按 3次/d, 每次 12粒, 服药 1周后出现上腹疼痛, 纳差, 泛酸, 腹泻, 停药 1 d后腹痛等症状缓解, 该患者无慢性胃病史。

讨论 患者既往无慢性胃病史, 发生腹痛前夕无特殊饮食或饮食不洁史, 在服用华佗再造丸 1周后, 患者出现上腹疼痛、腹泻, 停用华佗再造丸 1 d后疼痛、腹泻症状消失, 本例患者首次服用华佗再造丸, 考虑患者的腹痛和腹泻与华佗再造丸有关。

华佗再造丸成分为川芎、吴茱萸、冰片等, 能活血化瘀, 化痰通络, 行气止痛, 用于痰瘀阻络之中风恢复期和后遗症, 症见半身不遂、拘挛麻木、口眼歪斜、言语不清。组方中川芎理气, 其有效成分为川芎嗪, 能抑制血小板的聚集而抑制脑缺血时血栓的形成; 吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、温肝止泻之功能。有报道吴茱萸中毒症状表现为强烈的腹痛、腹泻、视力障碍、错觉、脱发、胸闷、头痛、眩晕或皮疹、孕妇易流产等症状。目前临床有关华佗再造丸的不良反映仅有皮肤过敏报道, 该药品说明书中未注明可能会出现胃肠道反应, 笔者也未查到有关此药引起腹痛、腹泻的报道, 考虑可能患者对华佗再造丸中成分吴茱萸敏感有关, 提示临床注意。

收稿日期: 2006-07-27