

左氧氟沙星致耳鸣、听力下降 1例

钱金根 (浙江省桐乡市第三人民医院, 浙江 桐乡 314501)

中图分类号: R978.27

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2007)03-0207-01

患者女性, 28岁, 工人。因“尿频、尿急 1周”而求诊。1周前无明显诱因下出现尿频、尿急, 无发热、腰酸, 无乏力。近6月来每天使用减肥药物及机械震荡法减肥, 未见疗效。近来有失眠, 纳差。否认有结核等传染病史, 家族史(-)。查体: 精神好, 肥胖貌, 面色正常, 无皮疹, 心肺(-), 腹平软, 肝、脾肋下未及。四肢肌力正常。血常规: WBC 6.3×10^9 , RBC 4.54×10^{12} , HCT 40.0, PLT 234×10^9 , N 67.9, L 25.8, M 6.3。尿常规: BLD+, WBC+。肝功能: ALT $33 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, AST $30 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$, 谷草 1.0, CK-MB同工酶 $15 \text{ IU} \cdot \text{L}^{-1}$, 总胆汁酸 $15 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HbsAg(-), 总蛋白: $79.3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 白蛋白 $51.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 球蛋白 $28.3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 白球 1.8, ALP $63 \text{ IU} \cdot \text{L}^{-1}$ 。诊断“急性尿路感染”。给于左氧氟沙星片(恒孚) 0.1, bid,

po。口服两次后即出现耳鸣、听力下降, 任氏 TEST(+), 气、骨传导均缩短。经停用药物 3 d后好转, 1周后听力恢复如常; Rinne's Test正常。

讨论: 急性尿路感染是临床常见病, 常见病原体为大肠杆菌、粪链球菌、支原体及衣原体最为常见。左氧氟沙星为氧氟沙星的左旋体, 因其广谱抗菌作用强, 不良反应小而被临床广泛应用。其常见不良反应为腹痛、腹泻、恶心、呕吐; 皮疹、红斑; 血尿等临床表现, 以耳鸣、听力下降为表现的未见报道, 本例虽然停药后恢复, 其致耳鸣、听力下降的机制不明, 可能与个体差异有关, 该药存在着神经毒性。在临床中应注意, 以防更严重的不良反应。

收稿日期: 2006-09-25