辅助表面活性剂对微乳相行为的影响

姚静,周建平,平其能,陈亮,卢韵(中国药科大学药剂教研室,南京 210009)

摘要:目的 考察辅助表面活性剂对微乳相行为的影响,指导微乳制剂的研究和开发。方法 采用滴水法制备微乳相图,以 O/W 微乳区面积和最大载油量为指标,考察辅助表面活性剂种类和性质对微乳形成的影响。结果 短链醇(2~3个碳)的微乳区显著大于长链醇(大于5个碳),而 CLogP 在 1 附近的正丁醇和苯甲醇辅助乳化效果亦较好;弱碱性助表(酰胺类)可促进采用弱酸性油相(如油酸)的微乳形成。结论 与油水两相间均有良好互溶性的助表更有利于微乳的形成。

作者简介:姚静,女,博士,讲师

Tel: (025) 83271 272

E-mail: yaoj3@163.com

Effect of Co-surfactant on Phase Behavior of Microemulsions

YAO Jing, ZHOU Jian-ping, PING Qi-neng, CHEN Liang, LU Yun (Department of pharmaceuticals, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To study the effect of the type and characterization of co-surfactant on the phase behavior of the microemulsions. **METHODS** The pseudo-ternary phase diagrams were constructed by the water titration method, and the effect of the co-surfactant on the phase diagram was also investigated. The region of microemulsion and the maximum oil-loaded content were used as the evaluating index. **RESULTS** The regions of the oil-in-water (o/w) microemulsion of the systems with short-chain alcohol (2-3 C chains) as the co-surfactant are much larger than those with long-chain alcohol (> 5 C chains). Both n-butanol and phenylmethanol were suitable for preparing microemulsions owing to their CLog P (near 1) although their carbon chains are longer. The amides with the weak alkalinity can facilitate the forming of the microemulsions using oleic acid as the oil phase. **CONCLUSION** A better co-surfactant should have the appropriate partition coefficient between oil and water, which may facilitate the forming of the microemulsions.

KEY WORDS: co-surfactants; microemulsions; pseudo-ternary phase diagram

微乳 (microemulsion, ME) 是由表面活性剂、辅助表面活性剂 (简称助表)、油及水组成的一种透明或半透明的热力学和动力学稳定的分散体系,一般粒径为 0.01 ~ 0.1 μm 左右。微乳制备工艺简单、热力学稳定、增溶能力强、易于吸收,是极具潜力的新型药物载体,近年来在国内外的应用日益广泛。

适宜的助表可插在表面活性剂分子之间,形成混合吸附层,使分子间距增大,侧向作用减弱,促进微乳的形成。尽管一些双亲的表面活性剂如 AOT, DDAB 可在无助表的情况下形成微乳,因为他们除了碳氢链外,还有一个小的头区 (亲水基)^[1-2]; 但大多数表面活性剂均需助表的参与,包括两性表面活性剂磷脂酰胆碱或磷脂,均需要加入助表破坏它的层状结构^[3-4]。因此,助表直接影响微乳的形成与稳定。Trotta 等^[5]认为理想的助表仅在界面处发挥作用,因为此时很小的助表量而水量很大时即可形成微乳,且无限稀释时并不会由于助表被稀释而破坏微乳的结构。

笔者采用聚氧乙烯蓖麻油 (Cremophor EL35) 为表面活性剂,研究不同类型和不同性质的助表对微乳形成的影响,为制剂研究和开发提供基础研究和理论依据。本实验将促进微乳形成的辅助成分均称之为助表。

1 试剂与仪器

试剂: Cremophor EL 35 (Crem EL, 德国 BASF 公司); 油酸 (上海凌峰化学试剂有限公司); PEG 系列 (金陵威尔化工有限公司); 乙醇、正丙醇、N,N-二甲基甲酰胺等均为分析醇。

仪器: FA-2004 型电子天平 (上海精密仪器厂); XW-80A 漩涡混合器 (上海医科大学仪器厂); HH-S112 型电热恒温水浴锅 (江苏省医疗器械厂); Zetasizer 3000 激光粒径测定仪 (英国 Malvern 公司)。

2 实验方法

2.1 相图制备

采用滴水法制备微乳相图,即将表面活性剂与助表按一

定质量混合均匀,混合物在室温下分别加入 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 的油,涡旋混匀后滴加蒸馏水,边加水边涡旋,直至形成透明或半透明的微乳,记录临界点的水量,继续滴定,直至系统状态不再变化。根据上述滴定的临界点,计算体系中各组分的质量百分比,以表面活性剂和助表 (SA/CoSA) 为一组分,同油、水作为伪三元相图的三个定点,每一条边表示相应两组分的比例关系,并计算 O/W 型微乳区的面积^[5]。

在滴定过程中,可能出现几种状态,结果见表 1。

表 1 微乳的伪三元相图各区域的划分

Tab 1 Regions partition of pseudo-ternary phase diagram of microemulsions

	a	b	c	d
状态	透明黏度大, 无乳光	透明黏度大, 有乳光	混浊	透明有乳光, 黏度近水
区域	液晶或凝胶区	W/O 型微乳区	乳剂区	O/W 型微乳区

乳化能力比较强的表面活性剂,与适当的助表和油组合时,仅出现液晶相和微乳相两种状态,本研究重点考察 O/W 型微乳区。

本实验以油酸: 橄榄油 (质量比 1:1) 为油相, Crem EL 为表面活性剂, Km (表面活性剂与助表的质量比) 为 9:5, 考察助表对微乳形成的影响。

2.2 最大载油量的确定

采用中点法确定微乳体系的最大载油量,分别计算载油量 K_1 和 K_2 :

$$K_1 = M_{Oil} / (M_{SA} + M_{CoSA} + M_{oil}); K_2 = M_{Oil} / (M_{SA} + M_{CoSA} + M_{Oil} + M_{Water})$$

K_1 为油在自微乳体系中的质量百分比, K_1 越大,说明表面活性剂乳化油的能力越强; K_2 为微乳区临界点上 (即自微乳体系自发形成微乳所需最小水量的临界点) 微乳中油的质量百分比,它可以辅助说明形成微乳所需的最小水量 (W_0),

K_2 越大, W_0 越小, 微乳越易形成, 微乳区范围越宽。另外, K_1, K_2 越大, 该体系在处方设计中的可调性越好。

2.3 粒径测定

采用 Zetasizer 3000 光子相关光谱仪测定微乳的粒径。

3 结果

3.1 醇类为助表

3.1.1 一元醇为助表 据图 1 和表 2, 2-3 个 C 的短链醇作

图 1 一元醇为助表时微乳的伪三元相图

阴影部分为 o/w 微乳区

Fig 1 Pseudo-ternary phase diagrams of microemulsions with monohydric alcohol as the co-surfactants

The shade area represents o/w microemulsion region

表 2 一元醇作助表对微乳相图的影响

Tab 2 Effect of monohydric alcohol as the co-surfactants on the phase diagrams

Type of Co-surfactant	Number of carbon atom	HLB ¹⁾	ME area /%	Solubilized oil /%		CLogP ²⁾	Range of size ($K_1 \leq 40\%$) / nm
				K_1	K_2		
Ethanol	2	7.950	31.0	50.3	25.6	-0.235	15.6 ~ 19.5
Propanol	3	7.475	13.2	46.1	26.2	0.294	16.2 ~ 19.6
Butanol	4	7.000	6.8	49.5	28.0	0.823	13.0 ~ 18.8
Pentanol	5	6.525	9.1	37.1	17.1	1.352	17.6 ~ 99.5
Heptanol	7	5.575	3.4	47.6	15.3	1.881	17.1 ~ 31.5
Octanol	8	5.100	6.3	30.8	17.7	2.410	14.4 ~ 24.8
Terpineol	10	4.148	5.8	40.0	18.8	2.629	14.0 ~ 48.6
Phenylmethanol	7	5.575	16.2	49.9	26.6	1.104	12.7 ~ 22.0
Isopropanol	3	7.475	Oil amount < 10%, no microemulsion area				/

注: ¹⁾ 此为结构因子法得到的估算值^[6]; ²⁾ 此为由 Cambridge Chem 3D 8.0 软件得到的估算值

Note: ¹⁾ the calculated value by the method of structural factors^[6]; ²⁾ the calculated value by Cambridge Chem 3D 8.0

3.1.2 二元醇作助表 据表 3 和图 2, 与 C 个数相同的正丙醇相比, 1,2-丙二醇的载油量没有明显变化, 但微乳区面积由 13.2% 下降至 9.3%, 而 1,3-丙二醇的微乳区下降了约 3 倍, 载油量也明显降低。此外, 丙二醇为助表时, 微乳载油量 K_1 超过 20% 后, 澄明度变差, 微乳粒径大于 80nm; 而正丙醇为助表的体系, 在载油量 K_1 小于 40% 的范围内, 形成的微乳粒径在 12.7 - 14.8 nm, 成乳效果更好, 这可能由于丙二醇对表

表 3 二元醇作助表对微乳相图的影响

Tab 3 Effect of dihydric alcohol as the co-surfactants on the phase diagrams

Type of Co-surfactant	CLogP	ME area /%	Solubilized oil /%	
			K_1	K_2
Propanol	0.294	13.2	46.1	26.2
1,2-propylene glycol(1,2-PG)	-1.138	9.3	49.3	28.1
1,3-propylene glycol(1,3-PG)	-1.369	4.0	36.6	20.2

助表, 其微乳区和增溶的油量均较大; 大于 4 个 C 后, 其微乳区面积明显减小, 此外除正丁醇外, 增溶油的能力也下降。但 7 个 C 的苯甲醇的微乳区和载油量均较大, 而支链的异丙醇对微乳形成无明显的促进作用。

一元醇为助表 ($K_1 \leq 40\%$) 时的粒径分布结果显示, 微乳的粒径分布范围与该体系增溶油的能力有关, 短链醇 ($\leq 4C$) 为助表时 K_1 和 K_2 均较大, 微乳的粒径分布也较窄。

图 2 二元醇为助表时微乳的伪三元相图

阴影部分为 o/w 微乳区

Fig 2 Pseudo-ternary phase diagrams of the microemulsions with dihydric alcohol as the co-surfactants

The shade area represents o/w microemulsion region

油脂类的溶解性不如正丙醇。

3.1.3 三元醇

单独采用甘油做助表时,微乳体系呈现明显的液晶态,继续加水不易破坏液晶的结构,难于制备微乳。所以从制备工艺的角度分析,甘油不适于做 Cream EL的助表。

图 3 酰胺和 PEG类为助表时微乳的伪三元相图

阴影部分为 o/w微乳区

Fig 3 Pseudo-ternary phase diagrams of the microemulsions with amides and PEG series as the co-surfactants

The shade area represents o/w microemulsion region

表 4 酰胺为助表对相图的影响

Tab 4 Effect of dimethylformamide (DMF) and dimethyl acetyl amide (DMA) as the co-surfactants on the phase diagrams

Type of Co-surfactant	ME area /%	Solubilized oil/%	
		K ₁	K ₂
DMF	9.5	48.18	22.59
DMA	11.0	51.30	28.96

3.3 PEG类

采用水溶性的低分子量 PEG系列作助表,尽管微乳区面积不大(小于 8%),但增溶的油量仍很大,且 PEG分子量越小,增溶的油量越大,可能是因为小分子的助表更容易插入胶束内部,与表面活性剂和油的相容性更好。见表 5。

表 5 PEG类为助表对微乳相图的影响

Tab 5 Effect of PEG series as the co-surfactants on the phase diagrams

Type of Co-surfactant	ME area /%	Solubilized oil/%	
		K ₁	K ₂
PEG-200	7.3	49.5	18.4
PEG-300	7.5	44.3	20.4
PEG-400	6.3	30.8	15.2
PEG-600	5.5	25.5	9.9

4 讨论

尽管无法测定醇在油相、水相及界面的分配系数,但是可以假设微乳在稀释过程中醇被稀释了 1 000倍,所以大部分醇存在于水相中,而部分醇可能被分配在界面,分配的量取决于醇的亲脂性^[7-8]。醇具有双亲性,部分被吸附入表面活性剂的极性端,并与表面活性剂单分子膜发生相互作用,促进了微乳的形成和稳定,且其本身对油相的溶解能力强,

3.2 酰胺类

据图 3和表 4,以酰胺类为助表时,体系载油量大,微乳区范围较宽,且得到的微乳状态良好,粒径均匀。可能是由于偏碱的酰胺与偏酸的油酸发生相互作用,增加体系的互溶性,更有利于微乳的形成。

故增加了微乳对油相的增溶,并增大了微乳区。但随碳链的增长,醇的亲脂性增加,则会降低其辅助作用,甚至充当油相的角色,导致微乳区减小。

对于 4 个碳的正丁醇,在水中具有一定的溶解度(0.59%左右,25℃),当水相的量达到或接近溶解它时,它可以发挥与短链醇相同的作用,同时其也具有较强的亲脂性,故亦可促进油穿插到界面膜中^[11],对界面膜的稳定作用更明显,增溶的油量也更大。苯甲醇与庚醇都含 7 个碳原子,但前者增溶油的能力和微乳区面积均大得多,这可能与其油水分配系数(CLG_P)有关。庚醇的 CLG_P为 1.881,亲脂性强,而苯甲醇为 1.104,具有一定的亲水性,故与正丁醇的情况类似。表 2中数据也显示,一元醇的 CLG_P越小,辅助能力越强。因此,助表应与油水两相均有较好的互溶性。而支链的异丙醇对微乳形成无明显的促进作用,可能与支链增加了醇的空间位阻,使其插入界面膜的阻力增大。

总之,大多数微乳的形成都需要助表的参与,其主要作用是:调节表面活性剂的 HLB;进一步降低油水间的界面张力;降低表面活性剂的相互排斥力和电荷斥力,增加界面膜的柔顺性和流动性,减少微乳生成时所需的界面弯曲能,促进微乳的形成^[9],另外,在自微乳体系,助表还可以提高自乳化的自发过程和增加对药物的增溶。

REFERENCES

- [1] EATOE J, FRAGNETO G, ROBINSON B H, *et al.* Variation of surfactant counterion and its effect on the structure and properties of Aerosol-OT-based water-in-oil microemulsions[J]. *J Chem Soc Faraday Trans*, 1992, 88(3): 461-467.
- [2] MAURIZIO O, MAURA M and LUIGI A. Microemulsions and emulsions in DDAB/water/oil system[J]. *Colloids surfaces A: Physicochem Eng Aspects*, 1999, 160(1): 23-36.
- [3] TROTTA M, PATTARINO F, GROSA G. Formation of lecithin-

- based microemulsions containing n-alkanol phosphocholines[J].
Int J Pham, 1998, 174(1-2): 253-259.
- [4] TENJARLA S. Microemulsions as drug delivery vehicles[J]. Curr Opin Colloid Interface Sci, 1996, 1(6): 826-832.
- [5] YAO J, ZHOU J P, LU Y, *et al.* Study on the mechanism of lipophilic drugs incorporation into microemulsion system [J]. J Chin Pham Univ (中国药科大学学报), 2005, 36(1): 27-30.
- [6] BI D Z. Pharmaceutics(药剂学)[M]. 4th. ed. Beijing: People's Health Press, 1999: 45-46.
- [7] ABOOFAZELI R, LAWRENCE M J. Investigation into the formation and characterization of phospholipid microemulsions: I Pseudo-ternary phase diagrams of systems containing water lecithin alcohol isopropyl myristate[J]. Int J Pham, 1995, 93 (1-3): 161-175.
- [8] TROTTA M. Influence of phase transformation on indomethacin release from microemulsions[J]. J Controlled Release, 1999, 60 (2-3): 399-405.
- [9] KOMMURU T R, GURLEY B, KHAN M A, *et al.* Self-emulsifying drug delivery systems(SEDDS) of coenzyme Q10: formulation development and bioavailability assessment[J]. Int J Pham, 2001, 212 (2): 233-246.

收稿日期: 2006-09-04