HPLC 同时测定病窦灵口服液中淫羊藿苷和丹酚酸 B 的含量

陈晶¹, 马丹¹, 赵陆华^{1*}, 王淑云² (1. 中国药科大学分析测试中心, 南京 210009; 2. 江苏省中医院, 南京 210029)

摘要:目的 建立一种反相高效液相色谱法, 同时测定病窦灵口服液中的 2 种有效成分。方法 采用 Alltech C₁₈ 柱, 乙腈 (A)-0.2% 冰醋酸 (B) 溶液梯度洗脱, 流速 1.0 mL · min⁻¹, 检测波长 270 nm, 柱温 30 °C。结果 采用 HPLC 检测制剂中丹酚酸 B 和淫羊藿苷的含量, 其线性关系良好, 线性范围分别为: 25.81 ~ 413.0 μg · mL⁻¹, 2.97 ~ 59.36 μg · mL⁻¹, 丹酚酸 B 回收率为 99.77%, RSD 为 0.5%; 淫羊藿苷回收率为 100.1%, RSD 为 2.3%。结论 本测定方法简便可行、重复性好, 可用于制剂的质量控制。

关键词: 高效液相色谱法; 病窦灵口服液; 丹酚酸 B; 淫羊藿苷

中图分类号: R917.101; R917.792

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693 (2009)04-0302-03

Simultaneous Determination of Salvianolic Acid B, Icariin in Bindouling Oral Liquid by HPLC

CHEN Jing¹, MA Dan¹, ZHAO Luhua^{1*}, WANG Shuyun² (1. Center for Instrumental Analysis of China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China; 2. Jiangsu Provincial TCM Hospital Affiliated to Nanjing University of TCM, Nanjing 210029, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To establish a method for simultaneously determining effective components in Bindouling oral liquid by RP-HPLC. **METHODS** HPLC analysis was performed on Alltech C₁₈ column (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) with a mixture of acetonitrile (A) and 0.2% acetic acid-water (B) as mobile phase in gradient mode. The column temperature was set at 30 °C and the flow rate was 1.0 mL · min⁻¹ with the wavelength at 270 nm. **RESULTS** The two effective components could be detected by this method, and their contents could be determined. A good linearity of salvianolic acid B, icariin was in the range of 25.81 – 413.0 μg · mL⁻¹, 2.97 – 59.36 μg · mL⁻¹, respectively. The average recoveries were 99.77% and 100.1% with RSD of 0.5% and 2.3%, respectively. **CONCLUSION** The method is simple, feasible and reliable. It can be used for the quality control of Bindouling oral liquid.

KEY WORDS: HPLC; Bindouling oral liquid; salvianolic acid B; icariin

病窦灵口服液由淫羊藿、丹参、黄芪、熟地黄、红参、甘草等 7 味中药精制而成, 具有益气温阳、养血通

作者简介: 陈晶, 女, 硕士生

* 通信作者: 赵陆华, 女, 副研究员

Tel: (025)83271185

E-mail: zhaoluhua@hotmail.com

脉等作用,用于病态窦房结综合征。临床应用近 10 年,效果明显。淫羊藿和丹参为其中君药,淫羊藿苷(icariin)和丹酚酸 B(salvianolic acid B)分别是淫羊藿和丹参的主要成分。淫羊藿苷属于黄酮类化合物,具有抗氧化、保护血管内皮细胞、促进人成骨细胞增殖和分化及提高性机能等药理作用;丹参水溶性成分丹酚酸 B 具有改善冠状循环、抑制血栓性疾病和抗氧化损伤之功效。因此,制剂中淫羊藿苷和丹酚酸 B 的含量测定对该制剂的质量控制,以及治疗药物监测具有重要的意义,但同时测定这两种成分的方法未见报道。为了快速、简便的测定中药复方中的活性成分,笔者建立了高效液相色谱法同时测定病窦灵口服液中淫羊藿苷、丹酚酸 B 的含量。

1 仪器与试剂

岛津 LC-10AD VP 高效液相色谱仪,岛津 SPD-10A VP 紫外检测器,浙江大学 N2000 色谱工作站。甲醇、冰醋酸为分析纯(南京化学试剂一厂),乙腈为色谱纯(tedia),水为纯净水。淫羊藿苷(0737-200111)、丹酚酸 B(111562-200403)标准品购自于中国药品生物制品检定所。所用药材购于南京先声药业,经中国药科大学宋学华教授鉴定。病窦灵口服液(购于江苏省中医院,批号:051214-051216-051218)

2 方法与结果

2.1 色谱条件

Alltech C_{18} 色谱柱(4.6 mm $\times$ 250 mm, 5 μ m); 流动相:乙腈(A)-0.2% 冰醋酸溶液(B),梯度洗脱 A 相 0~15 min(10%~20%),15~40 min(20%~35%),40~50 min(35%~55%);柱温:30 $^{\circ}$ C;检测波长:270 nm;流速 1.0 mL $\cdot$ min $^{-1}$ 。灵敏度 0.02 AUFS;理论板数按淫羊藿苷计算不低于 4 000。

2.2 溶液的制备

2.2.1 对照品溶液的制备 分别精密称取淫羊藿苷、丹酚酸 B 对照品,加甲醇溶解,配制成含淫羊藿苷 118.72 μ g $\cdot$ mL $^{-1}$,丹酚酸 B 413 μ g $\cdot$ mL $^{-1}$ 的对照品储备溶液。

2.2.2 供试品溶液的制备 精密量取病窦灵口服液 10 mL,至 25 mL 量瓶中,加甲醇 10 mL,超声 10 min,放置至室温,加甲醇稀释至刻度,摇匀,用 0.45 μ m 微孔滤膜滤过,弃初滤液,取续滤液,即得。

2.2.3 阴性溶液的制备 按处方及生产工艺分别模拟制备不含淫羊藿和丹参的阴性样品,按“2.2.2”项下操作,制得阴性样品溶液。

2.3 专属性考察

取上述样品溶液、阴性样品溶液和对照品贮备液的稀释液,用 0.45 μ m 滤膜滤过,按上述色谱条件进样,测绘 HPLC 图谱,结果见图 1。由图可见,样品中的淫羊藿苷、丹酚酸 B 与其他组分可达到基线分离,阴性样品在淫羊藿苷、丹酚酸 B 相应的保留时间出峰处无干扰。

图 1 HPLC 色谱图

A - 对照品混合物; B - 病窦灵口服液; C - 缺丹参阴性样品; D - 缺淫羊藿阴性样品; 1 - 丹酚酸 B; 2 - 淫羊藿苷

Fig 1 HPLC chromatograms

A - standard samples; B - Bindouling oral liquid; C - blank sample (salvia miltiorrhiza); D - blank sample (Herba Epimedii); 1 - salvianolic acid B; 2 - icariin

2.4 标准曲线的制备及线性关系考察

精密量取上述对照品贮备液,配制成含淫羊藿苷 2.97, 7.42, 14.84, 29.68, 59.36 μ g $\cdot$ mL $^{-1}$,丹酚酸 B 25.81, 51.62, 103.2, 206.5, 413.0 μ g $\cdot$ mL $^{-1}$ 的混合对照品溶液,摇匀。分别取上述溶液,按“2.1”项下色谱条件进样测定,记录峰面积。以淫羊藿苷、丹酚酸 B 浓度 X 为横坐标,峰面积 Y 为纵坐标,得回归方程。淫羊藿苷的回归方程为 $Y = 65 011X + 29 975$, $r = 0.999 1$;丹酚酸 B 的回归方程为 $Y = 16 883X - 41 644$, $r = 0.999 8$ 。结果表明,淫羊藿苷在 2.97 ~ 59.36 μ g $\cdot$ mL $^{-1}$,丹酚酸 B 在 25.81 ~

413.0 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 呈良好的线性关系。

2.5 仪器精密度试验

精密吸取同一对照品溶液, 重复进样 6 次, 以峰面积值计算 RSD, 淫羊藿苷、丹酚酸 B 分别为 0.94%, 0.71%。表明仪器精密度良好。

2.6 重复性试验

取同一批样品 10 mL, 精密量取, 共 6 份进行测定, 以含量测定结果计算 RSD, 淫羊藿苷、丹酚酸 B 分别为 1.75%, 1.43%, 表明重复性良好。

2.7 稳定性试验

将同一供试品溶液, 分别于制备后 2, 4, 6, 8, 24, 48 h 依法测定, 结果以峰面积值计算 RSD, 淫羊藿苷、丹酚酸 B 分别为 0.26%, 0.57%, 表明供试品溶液在 48 h 内基本稳定。

2.8 回收率试验

精密称取已知含量的同一批号的样品 5 mL, 共 9 份, 加入适量丹酚酸 B 及淫羊藿苷对照品, 按“2.2.2”项下制备方法制备, 依所述方法测定含量, 计算回收率, 结果见表 1、2。

表 1 丹酚酸 B 加样回收试验结果 ($n=9$)

Tab 1 Recovery of salvianolic acid B ($n=9$)

序号	已知量 /mg	加入量 /mg	测得量 /mg	回收率 /%	平均值 /%	RSD /%
1	1.458	0.708	2.162	99.44		
2	1.458	0.708	2.158	98.87		
3	1.458	0.708	2.173	100.99		
4	1.458	1.416	2.866	99.44		
5	1.458	1.416	2.879	100.4	99.68	0.6
6	1.458	1.416	2.863	99.22		
7	1.458	2.124	3.572	99.53		
8	1.458	2.124	3.580	99.91		
9	1.458	2.124	3.568	99.34		

表 2 淫羊藿苷加样回收试验结果 ($n=9$)

Tab 2 Recovery of icariin ($n=9$)

序号	已知量 /mg	加入量 /mg	测得量 /mg	回收率 /%	平均值 /%	RSD /%
1	0.500	0.238	0.736	99.15		
2	0.500	0.238	0.739	100.42		
3	0.500	0.238	0.737	99.57		
4	0.500	0.475	0.980	101.05		
5	0.500	0.475	0.978	100.63	99.98	0.7
6	0.500	0.475	0.971	99.16		
7	0.500	0.713	1.208	99.30		
8	0.500	0.713	1.218	100.70		
9	0.500	0.713	1.212	99.86		

2.9 样品测定

取 3 批样品, 按上述方法处理, 并测定以峰面积外标法计算含量, 结果见表 3。

表 3 病窦灵口服液中丹酚酸 B、淫羊藿苷的含量 ($n=3$)

Tab 3 Determination of salvianolic acid B and icariin in samples ($n=3$)

批号	丹酚酸 B/mg · 瓶 ⁻¹	淫羊藿苷/mg · 瓶 ⁻¹
051214	2.916	1.000
051216	2.956	1.001
051218	2.993	0.976

3 讨论

3.1 样品的提取方法选用了甲醇超声提取, 这样可以沉淀样品中多余的糖及部分杂质, 经考察, 超声 10 min 后进样, 样品峰无杂质干扰, 方法简便, 适用于该制剂的含量测定。

3.2 参考相关文献^[1-3], 本试验曾试用甲醇-醋酸, 乙腈-醋酸, 乙腈-甲酸等系统, 最终以乙腈-0.2% 冰醋酸溶液系统分离效果最好。因丹酚酸 B 与淫羊藿苷极性差别较大, 故考虑应用梯度洗脱, 分离效果理想, 重复性好, 因此本测定方法可用于病窦灵口服液中有有效成分的含量测定。

3.3 多指标成分的分离测定对于复方中药的质量控制具有重要意义。在该方中, 淫羊藿强心温肾, 对心肌细胞有明显的保护作用^[4], 丹参养血、活血, 共同起温补心肾气血阴阳、通脉作用。本试验建立了 HPLC 同时测定病窦灵口服液中的淫羊藿与丹参的 2 种指标成分, 相对于单指标的测定, 该法可以直接表征病窦灵口服液的质量。

REFERENCES

- [1] Ch. P(2005) Vol I (中国药典 2005 年版. 一部) [S]. 2005: 52, 229.
- [2] ZHAO L H, HUANG C Y, SHAN Z, et al. Fingerprint analysis of *Psoralea corylifolia* L. by HPLC and LC-MS [J]. J Chromatogr B, 2005, 821(1): 67-68.
- [3] JIANG L H, XU T S, CHEN X X, et al. A study on the HPLC method for salvianolic acid B in Radix Salviae Miltiorrhizae [J]. Lishizhen Med Mater Med Res (时珍国医国药), 2007, 18(6): 1395-1396.
- [4] PAN Z W, WANG Q J, LIU R M, et al. Protective effects of preconditioning of icariin on neonatal rat cardiomyocytes [J]. J Chin Pharm Univ (中国药科大学学报), 2007, 38(1): 73-76

收稿日期: 2007-08-01