

复方血栓通胶囊诱发胃痛 1 例

李亚玲,李俊,王纯玉(攀枝花学院附属医院中药房,四川 攀枝花 617000)

中图分类号:R994.11

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2009)04-0284-01

患者,女,64岁,58 kg,因视力下降,于2007年11月14日到我科眼科就诊。医生诊断为:视网膜静脉轻微阻塞、白内障早期。处方为:复方血栓通胶囊30粒×2盒(广东众生药业有限公司,批号:070513),每日2次,每次2粒。患者回家后于当日上午11时许服用复方血栓通胶囊2粒,40 min后感觉头痛,有轻微胃痛;晚上10时许,服用复方血栓通胶囊2粒,1 h后,患者胃痛加剧,痛至背心,伴口干、眼干、头晕。患者电话咨询眼科医生,医生详细追问患者用药史、病史、家族史等。患者否认曾用过此药,此次是第一次使用此药;患者有胃痛史,于2007年3月治愈,至2007年11月14日前未曾复发过;患者在服药前后未曾服用过能引起胃肠道不适的食物和药物,此次用药只有复方血栓通,没有其他药物;排除其他因素,因此医生考虑为:复方血栓通胶囊诱发的胃痛。建议立即停用此药,改服陈香露白露片每日3次,每次3片,可到中药房退未开封的药。11月16日,患者到药房退药,其胃痛明显缓解,其他症状消失。

讨论:复发血栓通胶囊的成分为:三七、黄芪、丹

参、玄参等。具有活血化瘀、益气养血的功效。常用于青光眼术后视力改善、高血压、视网膜静脉阻塞、胸痹、外伤性前房积血等。笔者查阅了CHKD期刊全文库(1915~1993)、CHKD期刊全文数据库(1994~2007)、不良反应题集等发现:几乎没有复方血栓通胶囊致不良反应的报道。复方血栓通胶囊成分中的黄芪有致头痛、胃肠道不适等不良反应的报道。复方血栓通诱发胃痛的不良反应在国内少见,在我院也是第一次。分析其诱发胃痛的原因:患者机体免疫力低,胃肠道功能不是太好,对药物耐受性差;患者以前曾有胃痛史,而在服药前未曾复发。

因此该患者的胃痛一方面是个体差异(有胃痛史)所致;一方面是与药物本身有关(其成分黄芪),其不良反应的文献报道与此患者有雷同之处。本次属于首次用药,在第1次服药时,有轻微胃痛;第2次服药时,胃痛加剧;停药后对症治疗,疗效显著。因此,此患者的胃痛确为复方血栓通胶囊所诱发。而复方血栓通胶囊的说明书中没有其不良反应的详细条款及原因,在临床用药时应引起重视。

收稿日期:2008-01-03

作者简介:李亚玲,女,主管中药师 Tel:(0812)3352923 E-mail:lylapothecary@yahoo.cn