

波依定引起严重牙龈肿痛 2 例

张宇梅, 王亚平, 王会接(北京军区总医院肾脏病科, 北京 100700)

中图分类号: R994.11

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2009)10-0804-01

1 病例资料

患者 1: 男, 82 岁。因患高血压于 2009 年 1 月服波依定(阿斯利康无锡制药有限公司, 批号: 0810033)5 mg, qd, 口服 1 d, 2.5 mg, qd, 口服 1 d, 共服用 2 d 后出现牙龈增生肿痛, 逐渐加重, 影响进食, 继续服用 10 d 后停止服药, 改用络活喜(辉瑞制药有限公司)5 mg, qd, 口服控制血压, 未经其他药物治疗, 2 d 后增生牙龈完全消退, 肿痛缓解。既往有牙龈炎病史, 肾功能正常。

患者 2: 女, 67 岁。因患高血压于 2006 年 10 月服波依定(阿斯利康无锡制药有限公司, 批号欠详)5 mg, qd, 口服, 用药后 7 个月逐渐出现牙龈增生, 明显疼痛, 张口困难, 影响进食, 改用络活喜(辉瑞制药有限公司)5 mg, qd, 口服控制血压, 未经其他药物治疗, 2 d 后增生牙龈完全消退, 肿痛

缓解。既往有牙龈炎病史, 肾功能正常。

2 讨论

波依定通用名称为非洛地平缓释片, 是一种血管选择性钙离子拮抗剂, 用于治疗高血压, 降压效果较好。2 例患者服用波依定后出现牙龈增生, 严重牙龈肿痛, 影响进食, 停药后未经治疗自然消失, 故认为病人的牙龈增生为口服波依定所致。从 2 例发病特点来看, 不良反应发生时间与用药次数及剂量无明显相关性, 同期治疗的其他病人服用同一批号、同一剂量并未出现此种不良反应。2 例患者在改用同样是钙离子拮抗剂的络活喜口服后, 未经其他药物治疗, 症状在 2 d 后很快缓解, 目前机理不明。考虑与个体差异有关, 与患者既往有牙龈炎病史相关。

收稿日期: 2009-03-25