

妈富隆引起视觉障碍 1 例

侯丽艳, 于成勇(山东省威海市文登中心医院药剂科, 山东 威海 264400)

中图分类号: R994.11

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2010)04-0299-01

患者, 女, 32 岁, 因月经不调来院就诊。妇科检查: 双侧卵巢增大。彩超检查提示: 双侧卵巢均匀性增大, 内部多个大小不等的无回声区, 包膜反光增强, 有多个卵泡。诊刮为增生期内膜。血常规检查正常, 激素测定: FSH 基值偏低, LH 升高, LH/FSH ≥ 3 , 血清睾酮雄烯二酮增高, 确诊为多囊卵巢综合征。治疗: 抗雄激素疗法, 口服避孕药妈富隆(南京欧加农制药有限公司, 批号: 0406012)按周期服用, 3 个月为一疗程。病人服用第 1 周期药物间, 感到轻微头昏, 恶心, 21 d 后正常来月经。第 2 周期坚持服用药物, 患者感到头昏加重, 视力模糊, 来院妇科就诊。患者自述, 视力下降开车分不清红绿灯, 眼非常疲劳, 视线模糊不清。眼科会诊。测左眼视力 0.8, 右眼视力 0.6, 镜检: 双眼底

视乳头轻度水肿, 色淡红, 边界清, 意识清楚, 语利, 双瞳孔大, 颅神经无异常, 视觉电生理检查, 未见明显异常。考虑为妈富隆引起的视觉障碍, 停药给予眼氨肽滴眼液 5 mL, 2 d, qid, 7 d 后复诊, 头昏减弱, 视线较清晰, 视力检查左眼 1.0, 右眼 0.8, 双眼底视乳头明显好转。1 个月后复查, 镜检均无异常, 视力检查左眼 1.2, 右眼 1.0, 恢复正常。

妈富隆为速效、短效避孕药, 避孕机制是显著抑制排卵和阻止孕卵着床, 并使宫颈黏稠度增加, 精子穿透阻力增大, 从而发挥速效避孕作用。常见不良反应恶心, 呕吐, 体重改变, 乳房触痛, 乏力似妊娠反应等。妈富隆引起视觉障碍的报道临床少见。临床用药应引起高度重视, 特别是开车的患者更应高度警惕, 应在医生的建议下使用。

收稿日期: 2009-10-14

作者简介: 侯丽艳, 女, 主管药师

Tel: 13869034335

E-mail: houliyan56789@sina.com