

注射用盐酸头孢替安致不良反应 1 例

张中平(福建泉州 180 医院骨一科, 福建 泉州 362000)

中图分类号: R994.11

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2010)09-0796-01

女性, 24 岁, 从事护理工作 4 年, 平素体健, 于 2009 年 9 月 4 日在配制 0.9%氯化钠 250 mL+注射用盐酸头孢替安 2.0 g 过程中, 因注射用盐酸头孢替安含有缓冲剂无水碳酸钠, 药液溶解时会产生大量的二氧化碳, 致使瓶体内压力过大, 造成药液迸出致该护士手部, 立即出现手部、面颈部奇痒, 咽部阻塞感, 呼吸困难, 胸闷、全身皮疹等症状, 立即给予地塞米松 10 mg, 非那根 25 mg 肌注, 取平卧头低位, 吸氧, 缓慢静脉输入 0.9%氯化钠 100 mL+氢化可的松 50 mg, 数分钟后症状缓解。

注射用盐酸头孢替安是半合成的第二代头孢菌素, 为盐酸头孢替安加适量无水碳酸钠制成的无

菌结晶性粉末。对革兰阴性菌作用较强, 用于治疗敏感菌所致的感染, 如肺炎、支气管炎、胆道感染、腹膜炎、尿路感染以及手术和外伤所致的感染和败血症等。本品在体内无积蓄作用, 主要以原形经过肾脏排泄, 一般 6 h 后尿中排出给药量的 70%左右。临床上常见的不良反应有恶心、呕吐、腹泻、过敏性休克、皮疹、荨麻疹、瘙痒、红斑、红细胞和血小板减少、嗜酸粒细胞增高等。调制时会发生接触性麻疹, 而本例在配制注射用盐酸头孢替安后出现咽部阻塞感、胸闷的这种不良反应没有报道, 值得临床护理人员的注意。

收稿日期: 2010-02-24

作者简介: 张中平, 女 Tel: 13559063765 E-mail: 197689789@qq.com