

夏枯草片致面部红斑 1 例

窦丹旒, 钱韦丹^{*}(无锡市中医医院药学部, 江苏 无锡 214000)

关键词: 夏枯草片; 面部红斑; 药物不良反应

中图分类号: R969.3

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2023)11-1542-02

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.20223403

引用本文: 窦丹旒, 钱韦丹. 夏枯草片致面部红斑 1 例[J]. 中国现代应用药学, 2023, 40(11): 1542-1543.

1 病例资料

患者, 女, 35 岁, 因“右乳肿块”, 要求手术治疗入院。既往体健, 否认输血史、食物药物过敏史。入院查体: 体温 36.4 ℃, 呼吸每分钟 86 次, 血压 101/67 mmHg。双乳形态正常, 大小对称, 乳头无凹陷溢液, 皮肤无桔皮样改变, 右侧乳房 7 点钟可扪及结节样肿块 1 枚, 大小约 1.5 cm×1.0 cm, 边界欠清, 质中, 无触痛, 活动度可, 左侧乳房未扪及明显肿块。双腋下及锁骨上未及明显肿大淋巴结。乳房彩超示: 右侧乳房乳腺内低回声团块, 考虑 BI-RADS 3 类, 两侧乳房乳腺增生。入院中西医双重诊断, 中医诊断为乳核(肝郁气滞), 西医诊断为右侧乳房纤维腺瘤。患者于 2022 年 2 月 8 日行局麻下右侧乳房肿块麦默通微创旋切术。术后给予氨甲环酸静滴止血, 乳酸钠林格静滴补液支持以及青宝散外敷预防静脉炎。术后患者胸闷不适, 必要时吸氧对症治疗。2 月 9 日, 因患者诉平时有双乳胀痛感, 予夏枯草片(四川森科制药有限公司, 批号: 211201; 规格: 每片 0.51 g) 3.06 g po bid 疏肝理气、清火散结治疗。患者服用夏枯草片后, 于 2 月 9 日下午开始出现面部红斑、瘙痒, 考虑夏枯草片过敏可能, 即停用该药, 未予其他特殊治疗, 停药后患者面部红斑消退, 瘙痒好转。未停用其他治疗药物, 患者在院期间未再出现上述类似的过敏症状。

2 讨论

患者既往无食物、药物及其他过敏史, 在口服夏枯草片当天即出现面部红斑、瘙痒, 停用夏枯草片后患者面部红斑消退, 瘙痒好转。患者使用夏枯草片期间同时使用了氨甲环酸注射液、乳酸钠林格注射液、青宝散等。虽然说明书示氨甲环酸氯化钠注射液能致瘙痒、皮疹等过敏反应, 但患者停用夏枯草片后, 其他治疗药物未停用或

减量, 均使用至患者出院, 期间患者未再出现类似不良反应, 故可排除合并用药所致。根据诺氏(Naranjo's)评估量表, 药物不良反应评估为 5 分, 可判定该患者面部红斑、瘙痒很可能是由夏枯草片所致, 评估结果见表 1。根据夏枯草片的药品说明书, 该药不良反应为尚不明确。通过检索 PubMed、中国知网和万方数据库, 近年来均未发现类似不良反应报道, 故考虑面部红斑、瘙痒可能为夏枯草片新的不良反应。

表 1 诺氏药物不良反应评估量表

Tab. 1 Naranjo's adverse drug reactions(ADR) evaluation scale

相关问题	问题分值			
	是	否	未知	得分
1. 该 ADR 先前是否有结论性报告?	+1	0	0	0
2. 该 ADR 是否是在使用可疑药物后发生的?	+2	-1	0	2
3. 该 ADR 是否在停药或应用拮抗剂后得到缓解?	+1	0	0	1
4. 该 ADR 是否在再次使用可疑药物后重复出现?	+2	-1	0	0
5. 是否存在其他原因能单独引起该 ADR?	-1	+2	0	2
6. 该 ADR 是否在应用安慰剂后重复出现?	-1	+1	0	0
7. 药物在血液或其他体液中是否达到毒性浓度?	+1	0	0	0
8. 该 ADR 是否随剂量增加而加重, 或随剂量减少而缓解?	+1	0	0	0
9. 患者是否曾暴露于同种或同类药物并出现过类似反应?	+1	0	0	0
10. 是否存在任何客观证据证实该反应?	+1	0	0	0
总分值	5 分			

注: 不良反应可能性分段, 总分值≥9 分, 确定的; 5~8 分, 很可能的; 1~4 分, 可能的; ≤0 分, 可疑的。

Note: Classification of adverse reaction possibility, total score≥9, definite; 5~8, probable; 1~4, possible; ≤0, doubtful.

夏枯草片为夏枯草单成分中成药, 夏枯草为唇形科双子叶植物夏枯草的干燥果穗, 始载于《神农本草经》, 味苦、辛, 性寒, 具有清肝泻火、明目、散结消肿之功, 用于赤肿痛、目珠夜痛、头痛眩晕、瘰疬、癭瘤、乳痈、乳癖和乳房胀痛等。夏枯草主

作者简介: 窦丹旒, 女, 副主任中药师 E-mail: doudanni@126.com

*通信作者: 钱韦丹, 女, 副主任药师 E-mail: 172396719@qq.com

要含有三萜及其苷类、甾醇及其苷类、黄酮类、苯丙素类、有机酸、挥发油和糖类等成分,有研究认为,夏枯草对免疫系统有双向调节作用,其成分中有些成分分子量较大,具有较强的抗原性,进入人体后可能形成过敏原,引起过敏反应。夏枯草的药理作用有抗肿瘤、消炎、抗菌、抗病毒、降血压、降血糖、降血脂、调节免疫、保肝、镇咳祛痰、抑眼眶成纤维细胞增生、防止尿草酸钙结石形成(大鼠)、抗氧化、镇静催眠和抗抑郁等。

夏枯草片为中成药,中成药药品说明书缺项

较多,不良反应常为尚不明确。因此,临床药师建议:①应严格按照药品说明书中的适应证、用法用量规范使用;②使用前应充分了解患者的既往用药史,食物药物过敏史等;③使用时应密切关注患者的临床表现,监测患者体征,警惕药物不良反应的发生,特别是首次使用时;④使用后若出现药物不良反应,应及时停药,对症治疗,保障临床用药安全。

收稿日期:2022-09-30

(本文责编:沈倩)

中国现代应用药理学
http://www.chinjmap.com